

Nome:

Cartão:

Turma:

Regras a observar:

- Seja sucinto porém completo.
- Justifique todo procedimento usado.
- Use notação matemática consistente.
- Trabalhe individualmente a sem uso de material de consulta além do fornecido.
- Devolva o caderno de questões preenchido ao final da prova.
- Não é permitido destacar folhas. Se precisar de folhas adicionais, solicite ao professor.
- É permitido o uso de calculadoras científicas sem recursos gráficos, de computação simbólica (ex. resolução de integrais) ou armazenamento de textos.

Formulário:

$$1. \cos(2t) = \cos^2(t) - \sin^2(t)$$

$$2. \sin(2t) = 2 \sin(t) \cos(t)$$

$$3. (a+b)^n = \sum_{j=0}^n \binom{j}{n} a^{n-j} b^j, \quad \binom{j}{n} = \frac{n!}{(n-j)! j!}$$

**Questão 1** (3.0) Considere a função  $f(t)$  dada por

$$f(t) = \frac{a^2}{a^2 + t^2}$$

onde  $a > 0$ .

- a) (1.0) Classifique esta função quanto à paridade, continuidade e causalidade. Esboce seu gráfico indicando eixos e valores notáveis.
- b) (2.0) Encontre a transformada de Fourier  $F(w)$  de  $f(t)$  e escreva na forma trigonométrica. Esboce o diagrama de amplitudes do espetro.

**Questão 2** (3.0) Sabendo que a transformada de Fourier de  $f(t) = e^{-t^2}$  é dada por  $F(w) = \sqrt{\pi}e^{-\frac{w^2}{4}}$ , use as convenientes propriedades da Transformada de Fourier para responder o que se pede:

- a) (1.0) Qual a transformada de Fourier de  $g(t) = e^{-a^2 t^2}$  onde  $a$  é uma constante positiva?
- b) (1.0) Sendo  $h(t) = \cos(20t)f(t)$ , encontre a transformada da Fourier de  $h(t)$  e esboce o diagrama de amplitudes.
- c) (1.0) Sendo  $i(t) = \cos(20t)^2 f(t)$ , encontre a transformada da Fourier de  $i(t)$  e esboce o diagrama de amplitudes.

**Questão 3** (2.0) Encontre uma representação em séries de Fourier para o trem de impulsos dado por

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT).$$

**Questão 4** (2.0) Usando a Transformada de Fourier encontre a solução da equação do calor dada por:

$$\begin{cases} \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}, & -\infty < x < \infty, \quad t > 0 \\ u(x,0) = \cos(k_0 x), & , -\infty < x < \infty \end{cases}$$

Dica: Você pode usar sem demonstrar que  $\mathcal{F}_x \{e^{iax}\} = 2\pi\delta(k - a)$ .