

<b>1 - 3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>Total</b>

**Nome:** \_\_\_\_\_ **Cartão:** \_\_\_\_\_

Regras Gerais:

- Não é permitido o uso de calculadoras, telefones ou qualquer outro recurso computacional ou de comunicação.
- Trabalhe individualmente e sem uso de material de consulta além do fornecido.
- Devolva o caderno de questões preenchido ao final da prova.

Regras para as questões abertas:

- Seja sucinto, completo e claro.
- Justifique todo procedimento usado.
- Indique identidades matemáticas usadas, em especial, itens da tabela.
- Use notação matemática consistente.

Propriedades das transformadas de Fourier: considere a notação  $F(w) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ .

1. Linearidade	$\mathcal{F}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha \mathcal{F}\{f(t)\} + \beta \mathcal{F}\{g(t)\}$
2. Transformada da derivada	Se $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} f(t) = 0$ , então $\mathcal{F}\{f'(t)\} = iw\mathcal{F}\{f(t)\}$ Se $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} f'(t) = 0$ , então $\mathcal{F}\{f''(t)\} = -w^2\mathcal{F}\{f(t)\}$
3. Deslocamento no eixo $w$	$\mathcal{F}\{e^{at}f(t)\} = F(w + ia)$
4. Deslocamento no eixo $t$	$\mathcal{F}\{f(t - a)\} = e^{-iaw}F(w)$
5. Transformada da integral	Se $F(0) = 0$ , então $\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(w)}{iw}$
6. Teorema da modulação	$\mathcal{F}\{f(t) \cos(w_0 t)\} = \frac{1}{2}F(w - w_0) + \frac{1}{2}F(w + w_0)$
7. Teorema da Convolução	$\mathcal{F}\{(f * g)(t)\} = F(w)G(w)$ , onde $(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t - \tau)d\tau$ $(F * G)(w) = 2\pi\mathcal{F}\{f(t)g(t)\}$
8. Conjugação	$\mathcal{F}(\bar{w}) = F(-w)$
9. Inversão temporal	$\mathcal{F}\{f(-t)\} = F(-w)$
10. Simetria ou dualidade	$f(-w) = \frac{1}{2\pi}\mathcal{F}\{F(t)\}$
11. Mudança de escala	$\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{ a }F\left(\frac{w}{a}\right)$ , $a \neq 0$
12. Teorema da Parseval	$\int_{-\infty}^{\infty}  f(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty}  F(w) ^2 dw$
13. Teorema da Parseval para Série de Fourier	$\frac{1}{T} \int_0^T  f(t) ^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty}  C_n ^2$

Séries e transformadas de Fourier:

	Forma trigonométrica	Forma exponencial
Série de Fourier	$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N [a_n \cos(w_n t) + b_n \sin(w_n t)]$ <p>onde <math>w_n = \frac{2\pi n}{T}</math>, <math>T</math> é o período de <math>f(t)</math></p> $a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(t)dt = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t)dt,$ $a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(w_n t)dt = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(w_n t)dt,$ $b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(w_n t)dt = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(w_n t)dt$	$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{i w_n t},$ <p>onde <math>C_n = \frac{a_n - i b_n}{2}</math></p>
Transformada de Fourier	$f(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} (A(w) \cos(wt) + B(w) \sin(wt)) dw$ , para $f(t)$ real, onde $A(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(wt) dt$ e $B(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin(wt) dt$	$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(w) e^{iwt} dw,$ <p>onde <math>F(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-iwt} dt</math></p>

Tabela de integrais definidas:

1. $\int_0^\infty e^{-ax} \cos(mx) dx = \frac{a}{a^2 + m^2}$ $(a > 0)$	2. $\int_0^\infty e^{-ax} \sin(mx) dx = \frac{m}{a^2 + m^2}$ $(a > 0)$
3. $\int_0^\infty \frac{\cos(mx)}{a^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2a} e^{-ma}$ $(a > 0, m \geq 0)$	4. $\int_0^\infty \frac{x \sin(mx)}{a^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-ma}$ $(a \geq 0, m > 0)$
5. $\int_0^\infty \frac{\sin(mx) \cos(nx)}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & n < m \\ \frac{\pi}{4}, & n = m, \\ 0, & n > m \end{cases}$ $(m > 0, n > 0)$	6. $\int_0^\infty \frac{\sin(mx)}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & m > 0 \\ 0, & m = 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & m < 0 \end{cases}$
7. $\int_0^\infty e^{-r^2 x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2r}$ $(r > 0)$	8. $\int_0^\infty e^{-a^2 x^2} \cos(mx) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a} e^{-\frac{m^2}{4a^2}}$ $(a > 0)$
9. $\int_0^\infty x e^{-ax} \sin(mx) dx = \frac{2am}{(a^2 + m^2)^2}$ $(a > 0)$	10. $\int_0^\infty e^{-ax} \sin(mx) \cos(nx) dx = \frac{m(a^2 + m^2 - n^2)}{(a^2 + (m-n)^2)(a^2 + (m+n)^2)}$ $(a > 0)$
11. $\int_0^\infty x e^{-ax} \cos(mx) dx = \frac{a^2 - m^2}{(a^2 + m^2)^2}$ $(a > 0)$	12. $\int_0^\infty \frac{\cos(mx)}{x^4 + 4a^4} dx = \frac{\pi}{8a^3} e^{-ma} (\sin(ma) + \cos(ma))$
13. $\int_0^\infty \frac{\sin^2(mx)}{x^2} dx =  m  \frac{\pi}{2}$	14. $\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-z^2} dz$
15. $\int_0^\infty \frac{\sin^2(ax) \sin(mx)}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{4}, & (0 < m < 2a) \\ \frac{\pi}{8}, & (0 < 2a = m) \\ 0, & (0 < 2a < m) \end{cases}$	16. $\int_0^\infty \frac{\sin(mx) \sin(nx)}{x^2} dx = \begin{cases} \frac{\pi m}{2}, & (0 < m \leq n) \\ \frac{\pi n}{2}, & (0 < n \leq m) \end{cases}$
17. $\int_0^\infty x^2 e^{-ax} \sin(mx) dx = \frac{2m(3a^2 - m^2)}{(a^2 + m^2)^3}$ $(a > 0)$	18. $\int_0^\infty x^2 e^{-ax} \cos(mx) dx = \frac{2a(a^2 - 3m^2)}{(a^2 + m^2)^3}$ $(a > 0)$
19. $\int_0^\infty \frac{\cos(mx)}{(a^2 + x^2)^2} dx = \frac{\pi}{4a^3} (1 + ma) e^{-ma}$ $(a > 0, m \geq 0)$	20. $\int_0^\infty \frac{x \sin(mx)}{(a^2 + x^2)^2} dx = \frac{\pi m}{4a} e^{-ma}$ $(a > 0, m > 0)$
21. $\int_0^\infty \frac{x^2 \cos(mx)}{(a^2 + x^2)^2} dx = \frac{\pi}{4a} (1 - ma) e^{-ma}$ $(a > 0, m \geq 0)$	22. $\int_0^\infty x e^{-a^2 x^2} \sin(mx) dx = \frac{m\sqrt{\pi}}{4a^3} e^{-\frac{m^2}{4a^2}}$ $(a > 0)$

Frequências das notas musicais em hertz:

Nota \ Escala	2	3	4	5	6	7
Dó	65,41	130,8	261,6	523,3	1047	2093
Dó ♯	69,30	138,6	277,2	554,4	1109	2217
Ré	73,42	146,8	293,7	587,3	1175	2349
Ré ♯	77,78	155,6	311,1	622,3	1245	2489
Mi	82,41	164,8	329,6	659,3	1319	2637
Fá	87,31	174,6	349,2	698,5	1397	2794
Fá ♯	92,50	185,0	370,0	740,0	1480	2960
Sol	98,00	196,0	392,0	784,0	1568	3136
Sol ♯	103,8	207,7	415,3	830,6	1661	3322
Lá	110,0	220,0	440,0	880,0	1760	3520
Lá ♯	116,5	233,1	466,2	932,3	1865	3729
Si	123,5	246,9	493,9	987,8	1976	3951

Identidades Trigonométricas:

$$\cos(x) \cos(y) = \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2}$$

$$\sin(x) \sin(y) = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2}$$

$$\sin(x) \cos(y) = \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}$$

Integrais:

$$\int x e^{\lambda x} dx = \frac{e^{\lambda x}}{\lambda^2} (\lambda x - 1) + C$$

$$\int x^2 e^{\lambda x} dx = e^{\lambda x} \left( \frac{x^2}{\lambda} - \frac{2x}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda^3} \right) + C$$

$$\int x^n e^{\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda} x^n e^{\lambda x} - \frac{n}{\lambda} \int x^{n-1} e^{\lambda x} dx + C$$

$$\int x \cos(\lambda x) dx = \frac{\cos(\lambda x) + \lambda x \sin(\lambda x)}{\lambda^2} + C$$

$$\int x \sin(\lambda x) dx = \frac{\sin(\lambda x) - \lambda x \cos(\lambda x)}{\lambda^2} + C$$

- Questão 1 (2.0 pontos) Considere a função

$$f(t) = -2 \cos^2(t) + \sin(2t) + \sin(4t).$$

e sua expansão em série de Fourier em que  $w_1$  é a frequência fundamental. Sobre a função  $f(t)$  e os coeficientes da sua série de Fourier, responda:

Frequência fundamental

- ( )  $w_1 = 1/2$
- ( )  $w_1 = 1$
- ( )  $w_1 = 2$
- ( )  $w_1 = 3$
- ( )  $w_1 = 4$

Módulo de  $C_2$


- ( )  $|C_2| = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- ( )  $|C_2| = \frac{1}{2}$
- ( )  $|C_2| = 1$
- ( )  $|C_2| = \sqrt{2}$
- ( )  $|C_2| = 2$

Fase de  $C_2$

- ( )  $\phi_2 = \frac{3\pi}{4}$
- ( )  $\phi_2 = \frac{\pi}{2}$
- ( )  $\phi_2 = \frac{\pi}{4}$
- ( )  $\phi_2 = -\frac{3\pi}{4}$
- ( )  $\phi_2 = -\frac{\pi}{2}$

- Potência Média  $\frac{1}{T} \int_0^T |f(t)|^2 dt$
- ( )  $\bar{P}_f = 1/2$
  - ( )  $\bar{P}_f = 1$
  - ( )  $\bar{P}_f = 3/2$
  - ( )  $\bar{P}_f = 2$
  - ( )  $\bar{P}_f = 5/2$

- Questão 2 (1.0 pontos) Considere uma aproximação discreta do diagrama de espectro de uma nota Mi 2 (82,5 Hz) dada pelo sinal  $f(t)$ .



O diagrama de espectro de fase do sinal  $f(t)$  é zero para todas as frequências. Responda os itens corretamente:

Nota produzida por  $g(t) = f(1,5t)$

Série de Fourier trigonométrica de  $f(t)$

- ( ) Lá 1      ( )  $f(t) = 2 \cos(165\pi t) + 0,8 \cos(370\pi t) + \cos(495\pi t) + 0,8 \cos(660\pi t)$
- ( ) Lá 2      ( )  $f(t) = \cos(165\pi t) + 0,4 \cos(370\pi t) + 0,5 \cos(495\pi t) + 0,4 \cos(660\pi t)$
- ( ) Si 2      ( )  $f(t) = 2 \sin(165\pi t) + 0,8 \sin(370\pi t) + \sin(495\pi t) + 0,8 \sin(660\pi t)$
- ( ) Mi 3      ( )  $f(t) = 1 + \sin(165\pi t) + 0,4 \sin(370\pi t) + 0,5 \sin(495\pi t) + 0,4 \sin(660\pi t)$
- ( ) Si 3      ( )  $f(t) = \frac{1}{2} + \cos(165\pi t) + 0,4 \sin(370\pi t) + 0,5 \cos(495\pi t) + 0,4 \sin(660\pi t)$

- Questão 3 (2.0 pontos) Seja  $f(t) = e^{-3|t|}$ ,  $g(t) := \mathcal{F}^{-1}\{iwF(w)\}$ ,  $h(t) := \mathcal{F}^{-1}\{G(w)e^{-5iw}\}$  e  $p(t) = f(t)e^{2t}$ , onde  $F(w) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ ,  $G(w) = \mathcal{F}\{g(t)\}$  e  $P(w) = \mathcal{F}\{p(t)\}$ . Responda corretamente.

$g(2)$

- ( )  $g(2) = -3e^{-6}$
- ( )  $g(2) = -3e^6$
- ( )  $g(2) = e^6$
- ( )  $g(2) = e^{-6}$
- ( )  $g(2) = e^{-2}$

$h(11)$

- ( )  $h(11) = -3e^{-11}$
- ( )  $h(11) = -3e^{-18}$
- ( )  $h(11) = -3e^{-33}$
- ( )  $h(11) = e^{-18}$
- ( )  $h(11) = e^{-33}$


$F(w)$

- ( )  $F(w) = \frac{2}{w^2 + 9}$
- ( )  $F(w) = \frac{2}{w^2 + 3}$
- ( )  $F(w) = \frac{6}{w^2 + 9}$
- ( )  $F(w) = \frac{1}{w^2 + 9}$
- ( )  $F(w) = \frac{1}{w^2 + 3}$

$P(w)$

- ( )  $P(w) = \frac{2}{(w - 2i)^2 + 9}$
- ( )  $P(w) = \frac{2}{(w + 2i)^2 + 3}$
- ( )  $P(w) = \frac{6}{(w + 2)^2 + 9}$
- ( )  $P(w) = \frac{1}{(w - 2)^2 + 9}$
- ( )  $P(w) = \frac{6}{(w + 2i)^2 + 9}$

- **Questão 4** (3.0 ponto) Considere a função periódica de período  $T = 2$  cujo gráfico é esboçado abaixo:




Aqui  $a$  é uma constante positiva menor que 1. Escreva esta função em séries de Fourier na seguinte forma:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(\pi n t) + b_n \sin(\pi n t)],$$

Trace o diagrama de amplitudes e o de fase quando  $a = 1/2$  com pelo menos duas raízes positivas e duas negativas. Indique eixos e valores notáveis.

- **Questão 5** (2.0 pontos) Seja  $f(t)$  uma função que possui transformada de Fourier  $F(w) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ . O gráfico abaixo apresenta o diagrama de espectro de magnitudes de  $F(w)$ .



Esboce o diagrama de magnitudes de  $g(t) = f'(t) \cos(4t)$  e  $h(t) = \frac{d}{dt} (f(t) \cos(4t))$ . Indique eixos e valores notáveis.