

1 - 4	5	6	Total

Nome: _____ Cartão: _____

Questão 1.(A) (0.8pt) A decomposição em série de Fourier de $f(t) = \begin{cases} |t|, & -1 \leq t < 1 \\ f(t+2) = f(t), & t \in \mathbb{R} \end{cases}$ produz

$$f(t) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \left(\cos(\pi t) + \frac{1}{3^2} \cos(3\pi t) + \frac{1}{5^2} \cos(5\pi t) + \frac{1}{7^2} \cos(7\pi t) + \frac{1}{9^2} \cos(9\pi t) + \dots \right), \quad t \in \mathbb{R}$$

O equacionamento de $f' \left(\frac{1}{2} \right) = 1$ implica:

() $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \dots = \frac{\pi}{4}$

(X) $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \dots = \frac{\pi}{4}$

() $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \dots = \frac{\pi^2}{4}$

() $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \dots = \frac{\pi^2}{4}$

() nenhuma das alternativas anteriores

Solução:

$$f' = -\frac{4}{\pi^2} \left(-\pi \sin(\pi t) - \pi \frac{\sin(3\pi t)}{3} - \pi \frac{\sin(5\pi t)}{5} - \pi \frac{\sin(7\pi t)}{7} - \pi \frac{\sin(9\pi t)}{9} + \dots \right)$$

aplicando $t = \frac{1}{2}$, usamos $\sin(\frac{\pi}{2}) = \sin(\frac{5\pi}{2}) = \sin(\frac{9\pi}{2}) = \dots = 1$

mas porém $\sin(\frac{3\pi}{2}) = \sin(\frac{7\pi}{2}) = \sin(\frac{11\pi}{2}) = \dots = -1$

e assim $1 = f'(\frac{1}{2}) = \frac{4}{\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \dots \right)$

finalmente implica na resposta marcada ao lado.

Questão 1.(B) (1.6pt) Considere a função $f(t) = 8 \cos^4(t)$. Calcule os coeficientes da expansão em série de Fourier de $f(t)$ e assinale na primeira coluna a representação trigonométrica e na segunda a representação exponencial.

() $3 + 8 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} \cos(2nt) + \frac{n}{2n+1} \sin(2nt) \right)$

(X) $3 + 4 \cos(2t) + \cos(4t)$

() $3 + 4 \cos(t) + 2 \cos(2t) + \cos(3t) + \frac{1}{2} \cos(4t)$

() $3 + 4 \sin(t) + 2 \sin(2t)$

() nenhuma das anteriores

() $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{3}{2n+1} - \frac{in}{2n^2+1} \right) e^{2nit}$

() $\frac{i}{2} e^{-4it} + 2e^{-2it} + 3 + 2e^{2it} - \frac{i}{2} e^{4it}$

() $\frac{i}{2} e^{-2it} + 2ie^{-it} + 3 - 2ie^{it} - \frac{i}{2} e^{2it}$

(X) $\frac{1}{2} e^{-4it} + 2e^{-2it} + 3 + 2e^{2it} + \frac{1}{2} e^{4it}$

() nenhuma das anteriores

Solução: Aqui $i^2 = -1$. Primeiramente:

$$f = 2(2 \cos^2(t))^2 = 2(1 + \cos(2t))^2 = 2(1 + 2 \cos(2t) + \cos^2(2t)) = 2 + 4 \cos(2t) + 2 \cos^2(2t) = 2 + 4 \cos(2t) + 1 + \cos(4t) = 3 + 4 \cos(2t) + \cos(4t)$$

e então

$$f = 3 + 4 \frac{e^{2it} + e^{-2it}}{2} + \frac{e^{4it} + e^{-4it}}{2} = \frac{1}{2} e^{-4it} + 2e^{-2it} + 3 + 2e^{2it} + \frac{1}{2} e^{4it}$$

Questão 2. (0.8pt) Considere $f(t) = te^{-|t|}$. Sobre a transformada de Fourier $F(w)$ de $f(t)$, é correto:

(X) $F(w) = \frac{-4iw}{(1+w^2)^2}$

() $F(w) = \frac{-2iw}{(1+w^2)^2}$

() $F(w) = \frac{-2w}{(1+w^2)^2}$

() $F(w) = \frac{1-w^2}{(1+w^2)^2}$

() nenhuma das alternativas anteriores

Solução: uma vez que $te^{-|t|}$ é uma função IMPAR,

$$F(w) = \int_{-\infty}^{\infty} te^{-|t|} e^{-iwt} dt = \int_{-\infty}^{\infty} te^{-|t|} (\cos(wt) - i \sin(wt)) dt = 0 - i \int_{-\infty}^{\infty} te^{-|t|} \sin(wt) dt = -2i \int_0^{\infty} te^{-t} \sin(wt) dt = -2i \frac{2(1)w}{(1^2 + w^2)^2} = \frac{4iw}{(1+w^2)^2}$$

Questão 3. (1.6pt) Resolva o seguinte problema de difusão de calor: $\begin{cases} 4u_t(x, t) - u_{xx}(x, t) = 0 \\ u(x, 0) = \delta(x-1) \end{cases}$

Assinale na primeira coluna a transformada de Fourier $U(k, t) = \mathcal{F}\{u(x, t)\}$ e na segunda a solução $u(x, t)$.

() $U(k, t) = e^{-ik} e^{-2k^2 t}$

() $U(k, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-k^2 t/4}$

() $U(k, t) = e^{-k^2 t/2}$

() $U(k, t) = \frac{e^{-ik}}{2\sqrt{\pi t}} e^{-k^2 t/4}$

(X) nenhuma das alternativas anteriores

(X) $u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-1)^2}{t}}$

() $u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{t}}$

() $u(x, t) = \frac{2}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}$

() $u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x+1)^2}{t}}$

() nenhuma das alternativas anteriores

Solução:

$$4U_t = (ik)^2 U = -k^2 U \Rightarrow U_t = -\frac{k^2}{4} U \Rightarrow U(k, t) = U(k, 0) e^{-\frac{k^2 t}{4}}$$

$$\text{Por outro lado } U(k, 0) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-1) e^{-ikx} dx = e^{-ik} \text{ implica } U(k, t) = e^{-ik} e^{-\frac{k^2 t}{4}}$$


$$\text{Por outro lado, } \mathcal{F}_x^{-1} \left[e^{-\frac{k^2 t}{4}} \right] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{k^2 t}{4}} e^{ikx} dk = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{k^2 t}{4}} (\cos(kx) + i \sin(kx)) dk$$



e como consequência da paridade de $e^{-\frac{k^2 t}{4}}$ em relação a k ,

$$\mathcal{F}_x^{-1} \left[e^{-\frac{k^2 t}{4}} \right] = \frac{2}{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-\frac{k^2 t}{4}} \cos(kx) dk = \frac{1}{\pi} \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}/2} e^{-\frac{x^2}{4t/4}} = \frac{e^{-x^2/t}}{\sqrt{\pi t}}$$

$$\text{Finalmente, pela propriedade da translação, } u(x, t) = \mathcal{F}_x^{-1} \left[e^{-ik} e^{-\frac{k^2 t}{4}} \right] = \frac{e^{-x^2/t}}{\sqrt{\pi t}} \Big|_{x=x-1} = \frac{e^{-\frac{(x-1)^2}{t}}}{\sqrt{\pi t}}$$

Questão 4. (1.2pt) Considere a função $f(t) = \cos(4\pi t) + 2\sin^2(\pi t)$. Sobre o diagrama de espectro de módulo (primeira coluna) e diagrama de espectro de fase, estão corretos:





() nenhuma das alternativas anteriores

() nenhuma das alternativas anteriores

Solução: Primeiramente, $f(t) = \cos(4\pi t) + 1 - \cos(2\pi t)$ e segue

$$f(t) = 1 - \frac{e^{2\pi it} + e^{-2\pi it}}{2} + \frac{e^{4\pi it} + e^{-4\pi it}}{2} = \frac{1}{2}e^{-4\pi it} - \frac{1}{2}e^{-2\pi it} + 1 - \frac{1}{2}e^{2\pi it} + \frac{1}{2}e^{4\pi it}$$

e segue $C_0 = 1$, $C_{-2} = C_2 = \frac{1}{2}$, e também $C_{-1} = C_1 = -\frac{1}{2}$.

Segue $\begin{cases} |C_{-2}| = 0.5 & , \phi_{-2} = 0 \\ |C_{-1}| = 0.5 & , \phi_{-1} = \pi \text{ ou } -\pi \\ |C_0| = 1 & , \phi_0 = 0 \\ |C_1| = 0.5 & , \phi_1 = \pi \text{ ou } -\pi \\ |C_2| = 0.5 & , \phi_2 = 0 \end{cases}$

Questão 5.(A) (1.0pt) Obtenha os coeficientes $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ da série de Fourier da função periódica

$$g(x) = 2 \operatorname{sen}^3(x) + 3 \cos(2x)$$

Solução:


$g(x) = \operatorname{sen}(x)[2 \operatorname{sen}^2(x)] + 3 \cos(2x) = \operatorname{sen}(x)[1 - \cos(2x)] + 3 \cos(2x) = \operatorname{sen}(x) + 3 \cos(2x) - \operatorname{sen}(x) \cos(2x)$
 aplicando relação trigonométrica do formulário

$$g(x) = \operatorname{sen}(x) + 3 \cos(2x) - \frac{\operatorname{sen}(x+2x) + \operatorname{sen}(x-2x)}{2} = \operatorname{sen}(x) + 3 \cos(2x) + \frac{1}{2} \operatorname{sen}(x) - \frac{1}{2} \operatorname{sen}(3x) = \frac{3}{2} \operatorname{sen}(x) - \frac{1}{2} \operatorname{sen}(3x) + 3 \cos(2x)$$

portanto $b_1 = \frac{3}{2}$, $b_3 = -\frac{1}{2}$, $a_2 = 3$ e todos os demais são nulos.

Questão 5.(B) (1.0pt) Considerando os coeficientes $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ da série de Fourier da função periódica

$$f(x) = \begin{cases} 2 \cos(x) & , x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \\ 0 & , x \in [-\pi, -\frac{\pi}{2}] \cup [\frac{\pi}{2}, \pi) \\ f(x+2\pi) & , x \in \mathbb{R} \end{cases}$$
 representada na figura abaixo



preencha com os valores numéricos:

a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	b_1	b_2	b_3

Solução: a função é par, assim $b_n = 0$ para todo n . A função é periódica e seu período é $T = 2\pi$.

$$a_0 = \frac{2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} 2 \cos(x) dx = \frac{4}{\pi} [\operatorname{sen}(x)]_0^{\pi/2} = \frac{4}{\pi}$$

$$a_1 = \frac{2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} 2 \cos(x) \cos(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} [1 + \cos(2x)] dx = \frac{2}{\pi} \left[x + \frac{\operatorname{sen}(2x)}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + 0 \right) = 1$$

Por outro lado, para $n > 1$,

$$a_n = \frac{2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} 2 \cos(x) \cos(nx) dx =$$

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} (\cos((n+1)x) + \cos((n-1)x)) dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\sin((n+1)x)}{n+1} + \frac{\sin((n-1)x)}{n-1} \right]_0^{\pi/2} \quad (\dagger)$$

mas observamos

$$\begin{cases} \sin((n-1)\frac{\pi}{2}) = \sin(n\pi/2) \cos(\pi/2) - \sin(\pi/2) \cos(n\pi/2) = -\cos(n\pi/2) \\ \sin((n+1)\frac{\pi}{2}) = \sin(n\pi/2) \cos(\pi/2) + \sin(\pi/2) \cos(n\pi/2) = \cos(n\pi/2) \end{cases}$$

e assim

$$a_n = \frac{2}{\pi} \cos(n\pi/2) \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n-1} \right) = \frac{2}{\pi} \cos(n\pi/2) \frac{-2}{n^2-1} = \frac{-4 \cos(n\pi/2)}{\pi(n^2-1)}, n > 1$$

implica nos valores numéricos.

a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	b_1	b_2	b_3
$\frac{4}{\pi}$	1	$\frac{4}{3\pi}$	0	$\frac{-4}{15\pi}$	0	0	0

Alternativamente, a partir de (\dagger) ,

$$\begin{cases} a_2 = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\sin(3\pi/2)}{3} + \frac{\sin(\pi/2)}{1} \right] = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) = \frac{4}{3\pi} \\ a_3 = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\sin(4\pi/2)}{4} + \frac{\sin(2\pi/2)}{2} \right] = 0 \\ a_4 = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\sin(5\pi/2)}{3} + \frac{\sin(3\pi/2)}{1} \right] = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3} \right) = \frac{-4}{15\pi} \end{cases}$$

Questão 6 Considere o problema

$$\begin{cases} u_t + 2u_x = -u, \text{ para todos } x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x), x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

6A.(0.8pt) Obtenha a transformada de Fourier $F(\cdot)$ de $f(x) = e^{-|x|}, x \in \mathbb{R}$

6B.(1.2pt) Encontre a solução $u(x, t)$ (e a respectiva transformada de Fourier $U(\cdot, t)$) do problema do enunciado para $f(x)$ conforme definida em **6A**.

Solução: (*) como consequência da paridade de $e^{-|x|}$

$$(A) F(w) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} e^{-iwx} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} (\cos(wx) - i \sin(wx)) dx \stackrel{*}{=} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} \cos(wx) dx \stackrel{*}{=} 2 \int_0^{\infty} e^{-x} \cos(wx) dx$$

e assim

$$F(w) = 2 \frac{1}{1+w^2} = \frac{2}{1+w^2}.$$

(B) Aplicando a transformada de Fourier na variável x

$$U_t + 2iwU = -U \Rightarrow U_t = (-1 - 2iw)U \Rightarrow U(w, t) = U(w, 0)e^{-(1+2iw)t}$$

onde $U(w, 0) = \mathcal{F}(f(x))$ foi obtido no subítem (A) desta questão.

Assim temos $U(w, t) = e^{-t} F(w) e^{-2iwt}$, o que implica

$$u(x, t) = \mathcal{F}_x^{-1} [e^{-t} F(w) e^{-2iwt}] = e^{-t} \mathcal{F}_x^{-1} [F(w) e^{-2iwt}] = e^{-t} f(x - 2t) = e^{-t} e^{-|x-2t|}$$

□