

1 - 4	5	6	Total

Nome: \_\_\_\_\_

Cartão: \_\_\_\_\_

Regras Gerais:

- Não é permitido o uso de calculadoras, telefones ou qualquer outro recurso computacional ou de comunicação.
- Trabalhe individualmente e sem uso de material de consulta além do fornecido.
- Devolva o caderno de questões preenchido ao final da prova.

Regras para as questões abertas:

- Seja sucinto, completo e claro. Justifique todo procedimento usado.
- Indique identidades matemáticas usadas, em especial, itens da tabela.
- Use notação matemática consistente.

1. Linearidade	$\mathcal{F}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha \mathcal{F}\{f(t)\} + \beta \mathcal{F}\{g(t)\}$
2. Transformada da derivada	Se $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} f(t) = 0$ , então $\mathcal{F}\{f'(t)\} = iw\mathcal{F}\{f(t)\}$ Se $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} f'(t) = 0$ , então $\mathcal{F}\{f''(t)\} = -w^2\mathcal{F}\{f(t)\}$
3. Deslocamento no eixo $w$	$\mathcal{F}\{e^{at}f(t)\} = F(w + ia)$
4. Deslocamento no eixo $t$	$\mathcal{F}\{f(t - a)\} = e^{-iaw}F(w)$
5. Transformada da integral	Se $F(0) = 0$ , então $\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(w)}{iw}$
6. Teorema da modulação	$\mathcal{F}\{f(t) \cos(w_0 t)\} = \frac{1}{2}F(w - w_0) + \frac{1}{2}F(w + w_0)$
7. Teorema da Convolução	$\mathcal{F}\{(f * g)(t)\} = F(w)G(w)$ , onde $(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t - \tau)d\tau$ $(F * G)(w) = 2\pi\mathcal{F}\{f(t)g(t)\}$
8. Conjugação	$\overline{F(w)} = F(-w)$
9. Inversão temporal	$\mathcal{F}\{f(-t)\} = F(-w)$
10. Simetria ou dualidade	$f(-w) = \frac{1}{2\pi}\mathcal{F}\{F(t)\}$
11. Mudança de escala	$\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{ a }F\left(\frac{w}{a}\right)$ , $a \neq 0$
12. Teorema da Parseval	$\int_{-\infty}^{\infty}  f(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty}  F(w) ^2 dw$
13. Teorema da Parseval para Série de Fourier	$\frac{1}{T} \int_0^T  f(t) ^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty}  C_n ^2$

	Forma trigonométrica	Forma exponencial
Série de Fourier	$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N [a_n \cos(w_n t) + b_n \sin(w_n t)]$ onde $w_n = \frac{2\pi n}{T}$ $T$ é o período de $f(t)$ , $a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(t)dt = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t)dt$ , $a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(w_n t)dt = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(w_n t)dt$ , $b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(w_n t)dt = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(w_n t)dt$	$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{i w_n t},$ onde $C_n = \frac{a_n - i b_n}{2}$
Transformada de Fourier	$f(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} (A(w) \cos(wt) + B(w) \sin(wt)) dw$ , para $f(t)$ real, onde $A(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(wt)dt$ e $B(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin(wt)dt$	$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(w) e^{iwt} dw$ $F(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-iwt} dt$

Tabela de integrais definidas:

1. $\int_0^\infty e^{-ax} \cos(mx) dx = \frac{a}{a^2 + m^2}$ $(a > 0)$	2. $\int_0^\infty e^{-ax} \sin(mx) dx = \frac{m}{a^2 + m^2}$ $(a > 0)$
3. $\int_0^\infty \frac{\cos(mx)}{a^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2a} e^{-ma}$ $(a > 0, m \geq 0)$	4. $\int_0^\infty \frac{x \sin(mx)}{a^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-ma}$ $(a \geq 0, m > 0)$
5. $\int_0^\infty \frac{\sin(mx) \cos(nx)}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & n < m \\ \frac{\pi}{4}, & n = m, \\ 0, & n > m \end{cases}$ $(m > 0, n > 0)$	6. $\int_0^\infty \frac{\sin(mx)}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & m > 0 \\ 0, & m = 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & m < 0 \end{cases}$
7. $\int_0^\infty e^{-r^2 x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2r}$ $(r > 0)$	8. $\int_0^\infty e^{-a^2 x^2} \cos(mx) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a} e^{-\frac{m^2}{4a^2}}$ $(a > 0)$
9. $\int_0^\infty x e^{-ax} \sin(mx) dx = \frac{2am}{(a^2 + m^2)^2}$ $(a > 0)$	10. $\int_0^\infty e^{-ax} \sin(mx) \cos(nx) dx = \frac{m(a^2 + m^2 - n^2)}{(a^2 + (m-n)^2)(a^2 + (m+n)^2)}$ $(a > 0)$
11. $\int_0^\infty x e^{-ax} \cos(mx) dx = \frac{a^2 - m^2}{(a^2 + m^2)^2}$ $(a > 0)$	12. $\int_0^\infty \frac{\cos(mx)}{x^4 + 4a^4} dx = \frac{\pi}{8a^3} e^{-ma} (\sin(ma) + \cos(ma))$
13. $\int_0^\infty \frac{\sin^2(mx)}{x^2} dx =  m  \frac{\pi}{2}$	14. $erf(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-z^2} dz$
15. $\int_0^\infty \frac{\sin^2(ax) \sin(mx)}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{4}, & (0 < m < 2a) \\ \frac{\pi}{8}, & (0 < 2a = m) \\ 0, & (0 < 2a < m) \end{cases}$	16. $\int_0^\infty \frac{\sin(mx) \sin(nx)}{x^2} dx = \begin{cases} \frac{\pi m}{2}, & (0 < m \leq n) \\ \frac{\pi n}{2}, & (0 < n \leq m) \end{cases}$
17. $\int_0^\infty x^2 e^{-ax} \sin(mx) dx = \frac{2m(3a^2 - m^2)}{(a^2 + m^2)^3}$ $(a > 0)$	18. $\int_0^\infty x^2 e^{-ax} \cos(mx) dx = \frac{2a(a^2 - 3m^2)}{(a^2 + m^2)^3}$ $(a > 0)$
19. $\int_0^\infty \frac{\cos(mx)}{(a^2 + x^2)^2} dx = \frac{\pi}{4a^3} (1 + ma) e^{-ma}$ $(a > 0, m \geq 0)$	20. $\int_0^\infty \frac{x \sin(mx)}{(a^2 + x^2)^2} dx = \frac{\pi m}{4a} e^{-ma}$ $(a > 0, m > 0)$
21. $\int_0^\infty \frac{x^2 \cos(mx)}{(a^2 + x^2)^2} dx = \frac{\pi}{4a} (1 - ma) e^{-ma}$ $(a > 0, m \geq 0)$	22. $\int_0^\infty x e^{-a^2 x^2} \sin(mx) dx = \frac{m\sqrt{\pi}}{4a^3} e^{-\frac{m^2}{4a^2}}$ $(a > 0)$

Identidades Trigonométricas:

$\cos(x) \cos(y) = \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2}$
$\sin(x) \sin(y) = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2}$
$\sin(x) \cos(y) = \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}$

Frequências das notas musicais em hertz:

Nota \ Escala	2	3	4	5	6	7
Dó	65,41	130,8	261,6	523,3	1047	2093
Dó ♯	69,30	138,6	277,2	554,4	1109	2217
Ré	73,42	146,8	293,7	587,3	1175	2349
Ré ♯	77,78	155,6	311,1	622,3	1245	2489
Mi	82,41	164,8	329,6	659,3	1319	2637
Fá	87,31	174,6	349,2	698,5	1397	2794
Fá ♯	92,50	185,0	370,0	740,0	1480	2960
Sol	98,00	196,0	392,0	784,0	1568	3136
Sol ♯	103,8	207,7	415,3	830,6	1661	3322
Lá	110,0	220,0	440,0	880,0	1760	3520
Lá ♯	116,5	233,1	466,2	932,3	1865	3729
Si	123,5	246,9	493,9	987,8	1976	3951

Integrais:

$\int x e^{\lambda x} dx = \frac{e^{\lambda x}}{\lambda^2} (\lambda x - 1) + C$
$\int x^2 e^{\lambda x} dx = e^{\lambda x} \left( \frac{x^2}{\lambda} - \frac{2x}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda^3} \right) + C$
$\int x^n e^{\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda} x^n e^{\lambda x} - \frac{n}{\lambda} \int x^{n-1} e^{\lambda x} dx + C$
$\int x \cos(\lambda x) dx = \frac{\cos(\lambda x) + \lambda x \sin(\lambda x)}{\lambda^2} + C$
$\int x \sin(\lambda x) dx = \frac{\sin(\lambda x) - \lambda x \cos(\lambda x)}{\lambda^2} + C$

**Questão 1.**(2.0pt) Considerando a expansão em série de Fourier de  $f(t) = 4 \operatorname{sen}^3(2t)$ , assinale na primeira coluna sua representação trigonométrica e na segunda sua representação exponencial. Aqui  $i^2 = -1$ .

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> $\operatorname{sen}(2t) - \operatorname{sen}(6t)$<br><input type="checkbox"/> $3 \operatorname{sen}(2t) - \operatorname{sen}(6t)$<br><input type="checkbox"/> $3 \operatorname{sen}(2t) + \operatorname{sen}(6t)$<br><input type="checkbox"/> $2 \operatorname{sen}(2t) - \operatorname{sen}(4t) + \operatorname{sen}(6t)$<br><input type="checkbox"/> $4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(nt)}{1 + 4/n}$<br><input type="checkbox"/> nenhuma das anteriores | $( ) 2i \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n n e^{nit}}{n+4}$<br>$( ) -\frac{i}{2}e^{-6it} + \frac{3i}{2}e^{-2it} - \frac{3i}{2}e^{2it} + \frac{i}{2}e^{6it}$<br>$( ) -\frac{i}{2}e^{-6it} + \frac{i}{2}e^{-2it} - \frac{i}{2}e^{2it} + \frac{i}{2}e^{6it}$<br>$( ) \frac{i}{2}e^{-6it} - \frac{i}{2}e^{-4it} + ie^{-2it} - ie^{2it} + \frac{i}{2}e^{4it} - \frac{i}{2}e^{6it}$<br>$( ) \frac{i}{2}e^{-6it} + \frac{3i}{2}e^{-2it} - \frac{3i}{2}e^{2it} - \frac{i}{2}e^{6it}$<br>$( ) \text{nenhuma das anteriores}$ |
|---|---|



**Questão 2.** (1.0pt) Considere a função periódica  $f(t) = \cos(2t) + \cos(3t) + \cos(4t)$ . Marque na primeira coluna seu período fundamental e na segunda sua frequência angular fundamental.

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2<br><input type="checkbox"/> $\pi$<br><input type="checkbox"/> $2\pi$<br><input type="checkbox"/> $\frac{\pi}{12}$<br><input type="checkbox"/> nenhuma das anteriores | <input type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2<br><input type="checkbox"/> $\pi$<br><input type="checkbox"/> $2\pi$<br><input type="checkbox"/> $\frac{\pi}{12}$<br><input type="checkbox"/> nenhuma das anteriores |
|---|---|

**Questão 3.** (2.0pt) Considere  $f(t) = e^{-t}u(t)$  e  $g(t) = f(t) - f(-t)$ , onde  $u(\cdot)$  é a função degrau unitário. Assinale na primeira coluna a transformada de Fourier  $\mathcal{F}(f)$ , e na segunda  $\mathcal{F}(g)$ . Aqui  $i^2 = -1$ .

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> $\frac{1}{1+w^2}$<br><input type="checkbox"/> $\frac{1-iw}{1+w^2}$<br><input type="checkbox"/> $\frac{2-2iw}{1+w^2}$<br><input type="checkbox"/> $\frac{1+iw}{1+w^2}$<br><input type="checkbox"/> $\frac{2+2iw}{1+w^2}$<br><input type="checkbox"/> nenhuma das anteriores | <input type="checkbox"/> $\frac{2}{1+w^2}$<br><input type="checkbox"/> $\frac{-2}{1+w^2}$<br><input type="checkbox"/> $\frac{2iw}{1+w^2}$<br><input type="checkbox"/> $\frac{2-2iw}{1+w^2}$<br><input type="checkbox"/> $\frac{-2iw}{1+w^2}$<br><input type="checkbox"/> nenhuma das anteriores |
|---|---|

**Questão 4.(1.0pt)** Considere os diagramas de espectro de módulo e de fase da série de Fourier de uma função  $f(t)$  de período  $T = 2$ .




Marque, na primeira coluna, o valor de  $\int_0^T f(t)dt$ ; na segunda, o valor de  $\int_0^T |f(t)|^2 dt$ .

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| ( ) $-\frac{1}{4}$         | ( ) $\frac{1}{4}$          |
| ( ) $-\frac{1}{2}$         | ( ) $\frac{1}{16}$         |
| ( ) $-1$                   | ( ) $\frac{27}{16}$        |
| ( ) $2$                    | ( ) $\frac{27}{4}$         |
| ( ) $\frac{1}{4}$          | ( ) $\frac{3}{4}$          |
| ( ) nenhuma das anteriores | ( ) nenhuma das anteriores |

Questões abertas (discursivas): entregue desenvolvimento em folhas avulsas, com seu nome.

**Questão 5A.(1.0pt)** Obtenha a expressão de  $f(t)$  da Questão 4. (deve conter apenas constante, senos e cossenos)

**Questão 5B.(1.0pt)** Obtenha a transformada de Fourier  $H(\cdot)$  da função  $h(x)$  definida abaixo.



**Questão 6** Considere o problema

$$\begin{cases} u_t + 2u_x = -u, \text{ para todos } x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x), x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

**6A.(0.8pt)** Obtenha a transformada de Fourier  $F(\cdot)$  de  $f(x) = e^{-|x|}$ ,  $x \in \mathbb{R}$

**6B.(1.2pt)** Encontre a solução  $u(x, t)$  (e a respectiva transformada de Fourier  $U(\cdot, t)$ ) do problema do enunciado para  $f(x)$  conforme definida em **6A**.

**Bom Trabalho.**