

1 - 3	4	5	Total

Nome: _____ Cartão: _____

Regras Gerais:

- Não é permitido o uso de calculadoras, telefones ou qualquer outro recurso computacional ou de comunicação.
- Trabalhe individualmente e sem uso de material de consulta além do fornecido.
- Devolva o caderno de questões preenchido ao final da prova.

Regras para as questões abertas:

- Seja sucinto, completo e claro.
- Justifique todo procedimento usado.
- Indique identidades matemáticas usadas, em especial, itens da tabela.
- Use notação matemática consistente.

Propriedades das transformadas de Fourier: considere a notação $F(w) = \mathcal{F}\{f(t)\}$.

1. Linearidade	$\mathcal{F}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha \mathcal{F}\{f(t)\} + \beta \mathcal{F}\{g(t)\}$
2. Transformada da derivada	Se $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} f(t) = 0$, então $\mathcal{F}\{f'(t)\} = iw\mathcal{F}\{f(t)\}$ Se $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} f'(t) = 0$, então $\mathcal{F}\{f''(t)\} = -w^2 \mathcal{F}\{f(t)\}$
3. Deslocamento no eixo w	$\mathcal{F}\{e^{at} f(t)\} = F(w + ia)$
4. Deslocamento no eixo t	$\mathcal{F}\{f(t-a)\} = e^{-iaw} F(w)$
5. Transformada da integral	Se $F(0) = 0$, então $\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(w)}{iw}$
6. Teorema da modulação	$\mathcal{F}\{f(t) \cos(w_0 t)\} = \frac{1}{2} F(w - w_0) + \frac{1}{2} F(w + w_0)$
7. Teorema da Convolução	$\mathcal{F}\{(f * g)(t)\} = F(w)G(w), \quad \text{onde } (f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t-\tau)d\tau$ $(F * G)(w) = 2\pi \mathcal{F}\{f(t)g(t)\}$
8. Conjugação	$\overline{F(w)} = F(-w)$
9. Inversão temporal	$\mathcal{F}\{f(-t)\} = F(-w)$
10. Simetria ou dualidade	$f(-w) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}\{F(t)\}$
11. Mudança de escala	$\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{ a } F\left(\frac{w}{a}\right), \quad a \neq 0$
12. Teorema da Parseval	$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(w) ^2 dw$
13. Teorema da Parseval para Série de Fourier	$\frac{1}{T} \int_0^T f(t) ^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n ^2$

Séries e transformadas de Fourier:

	Forma trigonométrica	Forma exponencial
Série de Fourier	$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N [a_n \cos(w_n t) + b_n \sin(w_n t)]$ <p>onde $w_n = \frac{2\pi n}{T}$, T é o período de $f(t)$</p> $a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt,$ $a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(w_n t) dt = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(w_n t) dt,$ $b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(w_n t) dt = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(w_n t) dt$	$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{i w_n t},$ <p>onde $C_n = \frac{a_n - i b_n}{2}$</p>
Transformada de Fourier	$f(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} (A(w) \cos(wt) + B(w) \sin(wt)) dw, \text{ para } f(t) \text{ real,}$ <p>onde $A(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(wt) dt$ e $B(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin(wt) dt$</p>	$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(w) e^{iwt} dw,$ <p>onde $F(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-iwt} dt$</p>

Tabela de integrais definidas:

1. $\int_0^\infty e^{-ax} \cos(mx) dx = \frac{a}{a^2 + m^2} \quad (a > 0)$	2. $\int_0^\infty e^{-ax} \sin(mx) dx = \frac{m}{a^2 + m^2} \quad (a > 0)$
3. $\int_0^\infty \frac{\cos(mx)}{a^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2a} e^{-ma} \quad (a > 0, m \geq 0)$	4. $\int_0^\infty \frac{x \sin(mx)}{a^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-ma} \quad (a \geq 0, m > 0)$
5. $\int_0^\infty \frac{\sin(mx) \cos(nx)}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & n < m \\ \frac{\pi}{4}, & n = m, \quad (m > 0, n > 0) \\ 0, & n > m \end{cases}$	6. $\int_0^\infty \frac{\sin(mx)}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & m > 0 \\ 0, & m = 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & m < 0 \end{cases}$
7. $\int_0^\infty e^{-r^2 x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2r} \quad (r > 0)$	8. $\int_0^\infty e^{-a^2 x^2} \cos(mx) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a} e^{-\frac{m^2}{4a^2}} \quad (a > 0)$
9. $\int_0^\infty x e^{-ax} \sin(mx) dx = \frac{2am}{(a^2 + m^2)^2} \quad (a > 0)$	10. $\int_0^\infty e^{-ax} \sin(mx) \cos(nx) dx = \frac{m(a^2 + m^2 - n^2)}{(a^2 + (m-n)^2)(a^2 + (m+n)^2)} \quad (a > 0)$
11. $\int_0^\infty x e^{-ax} \cos(mx) dx = \frac{a^2 - m^2}{(a^2 + m^2)^2} \quad (a > 0)$	12. $\int_0^\infty \frac{\cos(mx)}{x^4 + 4a^4} dx = \frac{\pi}{8a^3} e^{-ma} (\sin(ma) + \cos(ma))$
13. $\int_0^\infty \frac{\sin^2(mx)}{x^2} dx = m \frac{\pi}{2}$	14. $erf(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-z^2} dz$
15. $\int_0^\infty \frac{\sin^2(ax) \sin(mx)}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{4}, & (0 < m < 2a) \\ \frac{\pi}{8}, & (0 < 2a = m) \\ 0, & (0 < 2a < m) \end{cases}$	16. $\int_0^\infty \frac{\sin(mx) \sin(nx)}{x^2} dx = \begin{cases} \frac{\pi m}{2}, & (0 < m \leq n) \\ \frac{\pi n}{2}, & (0 < n \leq m) \end{cases}$
17. $\int_0^\infty x^2 e^{-ax} \sin(mx) dx = \frac{2m(3a^2 - m^2)}{(a^2 + m^2)^3} \quad (a > 0)$	18. $\int_0^\infty x^2 e^{-ax} \cos(mx) dx = \frac{2a(a^2 - 3m^2)}{(a^2 + m^2)^3} \quad (a > 0)$
19. $\int_0^\infty \frac{\cos(mx)}{(a^2 + x^2)^2} dx = \frac{\pi}{4a^3} (1 + ma) e^{-ma} \quad (a > 0, m \geq 0)$	20. $\int_0^\infty \frac{x \sin(mx)}{(a^2 + x^2)^2} dx = \frac{\pi m}{4a} e^{-ma} \quad (a > 0, m > 0)$
21. $\int_0^\infty \frac{x^2 \cos(mx)}{(a^2 + x^2)^2} dx = \frac{\pi}{4a} (1 - ma) e^{-ma} \quad (a > 0, m \geq 0)$	22. $\int_0^\infty x e^{-a^2 x^2} \sin(mx) dx = \frac{m\sqrt{\pi}}{4a^3} e^{-\frac{m^2}{4a^2}} \quad (a > 0)$

Frequências das notas musicais em hertz:

Nota \ Escala	2	3	4	5	6	7
Dó	65,41	130,8	261,6	523,3	1047	2093
Dó ♯	69,30	138,6	277,2	554,4	1109	2217
Ré	73,42	146,8	293,7	587,3	1175	2349
Ré ♯	77,78	155,6	311,1	622,3	1245	2489
Mi	82,41	164,8	329,6	659,3	1319	2637
Fá	87,31	174,6	349,2	698,5	1397	2794
Fá ♯	92,50	185,0	370,0	740,0	1480	2960
Sol	98,00	196,0	392,0	784,0	1568	3136
Sol ♯	103,8	207,7	415,3	830,6	1661	3322
Lá	110,0	220,0	440,0	880,0	1760	3520
Lá ♯	116,5	233,1	466,2	932,3	1865	3729
Si	123,5	246,9	493,9	987,8	1976	3951

Identidades Trigonométricas:

$$\begin{aligned} \cos(x) \cos(y) &= \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2} \\ \sin(x) \sin(y) &= \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2} \\ \sin(x) \cos(y) &= \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2} \end{aligned}$$

Integrais:

$$\begin{aligned} \int x e^{\lambda x} dx &= \frac{e^{\lambda x}}{\lambda^2} (\lambda x - 1) + C \\ \int x^2 e^{\lambda x} dx &= e^{\lambda x} \left(\frac{x^2}{\lambda} - \frac{2x}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda^3} \right) + C \\ \int x^n e^{\lambda x} dx &= \frac{1}{\lambda} x^n e^{\lambda x} - \frac{n}{\lambda} \int x^{n-1} e^{\lambda x} dx + C \\ \int x \cos(\lambda x) dx &= \frac{\cos(\lambda x) + \lambda x \sin(\lambda x)}{\lambda^2} + C \\ \int x \sin(\lambda x) dx &= \frac{\sin(\lambda x) - \lambda x \cos(\lambda x)}{\lambda^2} + C \end{aligned}$$

Questão 1. Considere $f(t) = -2\cos^2(t) + \sin(2t) + \sin(4t)$ e sua expansão em Série de Fourier (forma exponencial) $f = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{iw_n t}$ em que w_1 é a frequência fundamental, $i^2 = -1$, é correto:

- | | |
|--|---|
| (a)(0.8pt) Frequênci a fundamental | (b)(0.8pt) Módulo de C_2 |
| <input type="checkbox"/> $w_1 = 1$ | <input type="checkbox"/> $ C_2 = 2$ |
| <input type="checkbox"/> $w_1 = 2$ | <input type="checkbox"/> $ C_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| <input type="checkbox"/> $w_1 = 3$ | <input type="checkbox"/> $ C_2 = 1/2$ |
| <input type="checkbox"/> $w_1 = 4$ | <input type="checkbox"/> $ C_2 = 1$ |
| <input type="checkbox"/> $w_1 = 1/2$ | <input type="checkbox"/> $ C_2 = \sqrt{2}$ |
| <input type="checkbox"/> nenhuma das anteriores está correta | <input type="checkbox"/> nenhuma das anteriores está correta |
| (c)(0.8pt) Fase (argumento) de C_2 | (d)(0.8pt) Potênci a média $\frac{1}{T} \int_0^T f(t) ^2 dt$ |
| <input type="checkbox"/> $\phi_2 = -3\pi/4$ | <input type="checkbox"/> $\bar{P}_f = 1$ |
| <input type="checkbox"/> $\phi_2 = -\pi/2$ | <input type="checkbox"/> $\bar{P}_f = 1/2$ |
| <input type="checkbox"/> $\phi_2 = \pi/4$ | <input type="checkbox"/> $\bar{P}_f = 3/2$ |
| <input type="checkbox"/> $\phi_2 = \pi/2$ | <input type="checkbox"/> $\bar{P}_f = 2$ |
| <input type="checkbox"/> $\phi_2 = 3\pi/4$ | <input type="checkbox"/> $\bar{P}_f = 5/2$ |
| <input type="checkbox"/> nenhuma das anteriores está correta | <input type="checkbox"/> nenhuma das anteriores está correta |

Questão 2. Considere $f(t) = te^{-|t|}$, $g(t) = f(t) + f(-t)$, $h(t) = f(t) - f(-t)$, $i = \sqrt{-1}$

(A)(0.8pt) Sobre a transformada de Fourier $G(w)$ de $g(t)$, é correto:









- $G(w) = -2i \int_0^\infty te^{-t} \sin(wt) dt$
- $G(w) = 2 \int_0^\infty te^{-t} \cos(wt) dt$
- $G(w) = 0$
- $G(w) = \int_0^\infty te^{-t} (\cos(wt) - i \sin(wt)) dt$
- $G(w) = \int_0^\infty te^{-t} \cos(wt) dt$

nenhuma das alternativas anteriores

(B)(0.8pt) Sobre a transformada de Fourier $H(w)$ de $h(t)$, é correto:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> $H(w) = -2i \int_0^\infty te^{-t} \sin(wt) dt$ | <input type="checkbox"/> $H(w) = \int_0^\infty te^{-t} (\cos(wt) - i \sin(wt)) dt$ |
| <input type="checkbox"/> $H(w) = 2 \int_0^\infty te^{-t} \cos(wt) dt$ | <input type="checkbox"/> $H(w) = \int_0^\infty te^{-t} \cos(wt) dt$ |
| <input type="checkbox"/> $H(w) = 0$ | <input type="checkbox"/> nenhuma das alternativas anteriores |

Questão 3. (1.6pt) Considere a função $f(t) = \cos(4\pi t) + 2\sin^2(\pi t)$. Sobre o diagrama de espectro de módulo (primeira coluna) e diagrama de espetro de fase, estão corretos:



() nenhuma das anteriores

() nenhuma das anteriores

Questão 4. Sendo $u = u(x, t)$, considere o problema $\begin{cases} u_t(x, t) - 4u_{xx}(x, t) = 0 \\ u(x, 0) = \delta(x - 2) \end{cases}$

(A)(1.0pt) apresente o problema de valor inicial que sua transformada de Fourier $U(\cdot, t)$ deve satisfazer, e então obtenha expressão analítica para $U(\cdot, t)$

(B) (0.8pt) obtenha $u(x, t)$ como transformada inversa da expressão do ítem anterior.

Questão 5. Sendo $u = u(x, t)$, considere o problema

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = -u, \text{ para todos } x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x), x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

(A).(0.4pt) Obtenha a transformada de Fourier $F(\cdot)$ de $f(x) = 3\delta(x - 2)$, $x \in \mathbb{R}$, onde $\delta(\cdot)$ é a Delta de Dirac.

(B).(0.6pt) Obtenha a transformada de Fourier $G(\cdot)$ de $g(x) = e^{-\frac{x^2}{4t}}$, $x \in \mathbb{R}$, onde t é um parâmetro positivo, indicando as propriedades da tabela de transformadas de Fourier que foram usadas.

(C).(0.8pt) Sendo $f(x)$ como definida em (A), e $U(k, t)$ a transformada de Fourier, na variável x , de $u(x, t)$, obtenha e resolva uma equação diferencial ordinária que $U(k, t)$ satisfaz. Obtenha a solução $u(x, t)$ pela respectiva transformação inversa.

Bom Trabalho.