

1 - 5	6	7	Total

Nome: _____ Cartão: _____

Regras Gerais:

- Não é permitido o uso de calculadoras, telefones ou qualquer outro recurso computacional ou de comunicação.
- Trabalhe individualmente e sem uso de material de consulta além do fornecido.
- Devolva o caderno de questões preenchido ao final da prova.

Regras para as questões abertas:

- Seja sucinto, completo e claro.
- Justifique todo procedimento usado.
- Indique identidades matemáticas usadas, em especial, itens da tabela.
- Use notação matemática consistente.

Identidades:

$\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$	$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$
$\operatorname{senh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
$(a+b)^n = \sum_{j=0}^{\infty} \binom{n}{j} a^{n-j} b^j, \quad \binom{n}{j} = \frac{n!}{j!(n-j)!}$	
	$\sin(x+y) = \sin(x)\cos(y) + \sin(y)\cos(x)$
	$\cos(x+y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y)$

Propriedades:

1	Linearidade	$\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha \mathcal{L}\{f(t)\} + \beta \mathcal{L}\{g(t)\}$
2	Transformada da derivada	$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0)$ $\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2\mathcal{L}\{f(t)\} - sf(0) - f'(0)$
3	Deslocamento no eixo s	$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$
4	Deslocamento no eixo t	$\mathcal{L}\{u(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}F(s)$ $\mathcal{L}\{u(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s}$
5	Transformada da integral	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$
6	Filtragem da Delta de Dirac	$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-a)dt = f(a)$
7	Transformada da Delta de Dirac	$\mathcal{L}\{\delta(t-a)\} = e^{-as}$
8	Teorema da Convolução	$\mathcal{L}\{(f*g)(t)\} = F(s)G(s),$ onde $(f*g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$
9	Transformada de funções periódicas	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1-e^{-sT}} \int_0^T e^{-s\tau} f(\tau)d\tau$
10	Derivada da transformada	$\mathcal{L}\{tf(t)\} = -\frac{dF(s)}{ds}$
11	Integral da transformada	$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^{\infty} F(s)\hat{s}$

Séries:

$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 \dots, \quad -1 < x < 1$
$\frac{x}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x + 2x^2 + 3x^3 + \dots, \quad -1 < x < 1$
$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, \quad -\infty < x < \infty$
$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad -1 < x < 1$
$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad -1 < x < 1$
$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad -\infty < x < \infty$
$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad -\infty < x < \infty$
$\operatorname{senh}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad -\infty < x < \infty$
$\cosh(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad -\infty < x < \infty$
$(1+x)^m = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!} x^n, \quad -1 < x < 1, m \neq 0, 1, 2, \dots$

Funções especiais:

Função Gamma	$\Gamma(k) = \int_0^{\infty} x^{k-1} e^{-x} dx$
Propriedade da Função Gamma	$\Gamma(k+1) = k\Gamma(k), \quad k > 0$ $\Gamma(n+1) = n!, \quad n \in \mathbb{N}$
Função de Bessel modificada de ordem ν	$I_{\nu}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!\Gamma(m+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+\nu}$
Função de Bessel de ordem 0	$J_0(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!2^m} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m}$
Integral seno	$\text{Si}(t) = \int_0^t \frac{\sin(x)}{x} dx$

Integrais:

$\int xe^{\lambda x} dx = \frac{e^{\lambda x}}{\lambda^2} (\lambda x - 1) + C$
$\int x^2 e^{\lambda x} dx = e^{\lambda x} \left(\frac{x^2}{\lambda} - \frac{2x}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda^3} \right) + C$
$\int x^n e^{\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda} x^n e^{\lambda x} - \frac{n}{\lambda} \int x^{n-1} e^{\lambda x} dx + C$
$\int x \cos(\lambda x) dx = \frac{\cos(\lambda x) + \lambda x \sin(\lambda x)}{\lambda^2} + C$
$\int x \sin(\lambda x) dx = \frac{\sin(\lambda x) - \lambda x \cos(\lambda x)}{\lambda^2} + C$

Tabela de transformadas de Laplace:

	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$	$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$
1	$\frac{1}{s}$	1
2	$\frac{1}{s^2}$	t
3	$\frac{1}{s^n}, \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$
4	$\frac{1}{\sqrt{s}},$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}$
5	$\frac{1}{s^{\frac{3}{2}}},$	$2\sqrt{\frac{t}{\pi}}$
6	$\frac{1}{s^k}, \quad (k > 0)$	$\frac{t^{k-1}}{\Gamma(k)}$
7	$\frac{1}{s-a}$	e^{at}
8	$\frac{1}{(s-a)^2}$	te^{at}
9	$\frac{1}{(s-a)^n}, \quad (n = 1, 2, 3\dots)$	$\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}e^{at}$
10	$\frac{1}{(s-a)^k}, \quad (k > 0)$	$\frac{1}{\Gamma(k)}t^{k-1}e^{at}$
11	$\frac{1}{(s-a)(s-b)}, \quad (a \neq b)$	$\frac{1}{a-b}(e^{at} - e^{bt})$
12	$\frac{s}{(s-a)(s-b)}, \quad (a \neq b)$	$\frac{1}{a-b}(ae^{at} - be^{bt})$
13	$\frac{1}{s^2 + w^2}$	$\frac{1}{w} \operatorname{sen}(wt)$
14	$\frac{s}{s^2 + w^2}$	$\cos(wt)$
15	$\frac{1}{s^2 - a^2}$	$\frac{1}{a} \operatorname{senh}(at)$
16	$\frac{s}{s^2 - a^2}$	$\cosh(at)$
17	$\frac{1}{(s-a)^2 + w^2}$	$\frac{1}{w}e^{at} \operatorname{sen}(wt)$
18	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + w^2}$	$e^{at} \cos(wt)$
19	$\frac{1}{s(s^2 + w^2)}$	$\frac{1}{w^2}(1 - \cos(wt))$
20	$\frac{1}{s^2(s^2 + w^2)}$	$\frac{1}{w^3}(wt - \operatorname{sen}(wt))$
21	$\frac{1}{(s^2 + w^2)^2}$	$\frac{1}{2w^3}(\operatorname{sen}(wt) - wt \cos(wt))$
22	$\frac{s}{(s^2 + w^2)^2}$	$\frac{t}{2w} \operatorname{sen}(wt)$
23	$\frac{s^2}{(s^2 + w^2)^2}$	$\frac{1}{2w}(\operatorname{sen}(wt) + wt \cos(wt))$
24	$\frac{s}{(s^2 + a^2)(s^2 + b^2)}, \quad (a^2 \neq b^2)$	$\frac{1}{b^2 - a^2}(\cos(at) - \cos(bt))$
25	$\frac{1}{(s^4 + 4a^4)}$	$\frac{1}{4a^3}[\operatorname{sen}(at) \cosh(at) - \cos(at) \operatorname{senh}(at)]$
26	$\frac{s}{(s^4 + 4a^4)}$	$\frac{1}{2a^2} \operatorname{sen}(at) \operatorname{senh}(at))$
27	$\frac{1}{(s^4 - a^2)}$	$\frac{1}{2a^3}(\operatorname{senh}(at) - \operatorname{sen}(at))$
28	$\frac{s}{(s^4 - a^4)}$	$\frac{1}{2a^2}(\cosh(at) - \cos(at))$

	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$	$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$
29	$\sqrt{s-a} - \sqrt{s-b}$	$\frac{1}{2\sqrt{\pi t^3}}(e^{bt} - e^{at})$
30	$\frac{1}{\sqrt{s+a}\sqrt{s+b}}$	$e^{-\frac{(a+b)t}{2}} I_0\left(\frac{a-b}{2}t\right)$
31	$\frac{1}{\sqrt{s^2 + a^2}}$	$J_0(at)$
32	$\frac{s}{(s-a)^{\frac{3}{2}}}$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}e^{at}(1+2at)$
33	$\frac{1}{(s^2 - a^2)^k}, \quad (k > 0)$	$\frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(k)}\left(\frac{t}{2a}\right)^{k-\frac{1}{2}} I_{k-\frac{1}{2}}(at)$
34	$\frac{1}{s}e^{-\frac{k}{s}}, \quad (k > 0)$	$J_0(2\sqrt{kt})$
35	$\frac{1}{\sqrt{s}}e^{-\frac{k}{s}}$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \cos(2\sqrt{kt})$
36	$\frac{1}{s^{\frac{3}{2}}}e^{\frac{k}{s}}$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \operatorname{senh}(2\sqrt{kt})$
37	$e^{-k\sqrt{s}}, \quad (k > 0)$	$\frac{k}{2\sqrt{\pi t^3}}e^{-\frac{k^2}{4t}}$
38	$\frac{1}{s} \ln(s)$	$-\ln(t) - \gamma, \quad (\gamma \approx 0,5772)$
39	$\ln\left(\frac{s-a}{s-b}\right)$	$\frac{1}{t}(e^{bt} - e^{at})$
40	$\ln\left(\frac{s^2 + w^2}{s^2}\right)$	$\frac{2}{t}(1 - \cos(wt))$
41	$\ln\left(\frac{s^2 - a^2}{s^2}\right)$	$\frac{2}{t}(1 - \cosh(at))$
42	$\tan^{-1}\left(\frac{w}{s}\right)$	$\frac{1}{t} \operatorname{sen}(wt)$
43	$\frac{1}{s} \cot^{-1}(s)$	$\operatorname{Si}(t)$
44	$\frac{1}{s} \tanh\left(\frac{as}{2}\right)$	Onda quadrada $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < a \\ -1, & a < t < 2a \end{cases}$ $f(t+2a) = f(t), \quad t > 0$
45	$\frac{1}{as^2} \tanh\left(\frac{as}{2}\right)$	Onda triangular $f(t) = \begin{cases} \frac{t}{a}, & 0 < t < a \\ -\frac{t}{a} + 2, & a < t < 2a \end{cases}$ $f(t+2a) = f(t), \quad t > 0$
46	$\frac{w}{(s^2 + w^2)\left(1 - e^{-\frac{\pi}{w}s}\right)}$	Retificador de meia onda $f(t) = \begin{cases} \operatorname{sen}(wt), & 0 < t < \frac{\pi}{w} \\ 0, & \frac{\pi}{w} < t < \frac{2\pi}{w} \end{cases}$ $f\left(t + \frac{2\pi}{w}\right) = f(t), \quad t > 0$
47	$\frac{w}{s^2 + w^2} \coth\left(\frac{\pi s}{2w}\right)$	Retificador de onda completa $f(t) = \operatorname{sen}(wt) $
48	$\frac{1}{as^2} - \frac{e^{-as}}{s(1 - e^{-as})}$	Onda dente de serra $f(t) = \frac{t}{a}, \quad 0 < t < a$ $f(t) = f(t-a), \quad t > a$

- **Questão 1** (1.0 ponto) Seja $f(t) = \operatorname{sen}^2(t)$ e $g(t) = (\operatorname{sen}(t) + e^{-t})^2$. Assinale as alternativas que indicam respectivamente $\mathcal{L}\{f(t)\}$ e $\mathcal{L}\{g(t)\}$:

() $Y(s) = \frac{s^2 + 2}{s^3 + 4s}$

() $Y(s) = \frac{s - 2}{s^3 + 4s}$

() $Y(s) = \frac{2}{s^2 + 4}$

() $Y(s) = \frac{s}{s^2 + 4}$

(x) $Y(s) = \frac{2}{s^3 + 4s}$

() $Y(s) = \frac{s^2 + 2}{s^3 + 4s}$

() $Y(s) = \frac{2}{s^3 + 4s} + \frac{1}{s + 2}$

(x) $Y(s) = \frac{2}{s^3 + 4s} + \frac{2}{(s + 1)^2 + 1} + \frac{1}{s + 2}$

() $Y(s) = \frac{2}{s^2 + 4} + \frac{s}{s^2 + 1} + \frac{1}{s - 2}$

() $Y(s) = \frac{1}{s^2 + 1} + \frac{1}{s + 1}$

() $Y(s) = \frac{2}{s^3 + 4s} + \frac{2}{(s - 1)^2 + 1} + \frac{1}{s - 2}$

- **Questão 2** (1.0 ponto) Sabendo que $y'''(t) + y'(t) = 1$ e $y''(0) = 1$, $y'(0) = 1$ e $y(0) = 0$. Assinale as alternativas que indicam respectivamente uma expressão para $Y(s) := \mathcal{L}\{y(t)\}$ e $y(t)$

() $Y(s) = \frac{s + 2s^2}{s^2 + 1}$

() $Y(s) = \frac{2 + s^2}{s^2(s^2 + 1)}$

() $Y(s) = \frac{2 + s}{s^2 + 1}$

(x) $Y(s) = \frac{1 + s + s^2}{s^2(s^2 + 1)}$

() $Y(s) = \frac{1 + s + s^2}{s(s^2 + 1)}$

(x) $y(t) = 1 + t - \cos(t) + \operatorname{sen}(t)$

() $y(t) = \delta(t) + \operatorname{sen}(t)$

() $y(t) = 2 - 2\cos(t) + \operatorname{sen}(t)$

() $y(t) = 1 + \operatorname{sen}(t)$

() $y(t) = 1 - \cos(t)$

- **Questão 3** (1.0 ponto) Sabendo que $f(t) = (u(t) + u(t - 1) + u(t - 2))$ e $g(t) = 2^{f(t)}$ Assinale as alternativas que indicam respectivamente uma expressão para $F(s) := \mathcal{L}\{f(t)\}$ e $G(s) := \mathcal{L}\{g(t)\}$

() $F(s) = \frac{1 + 2e^{-s} + 3e^{-2s}}{s^2}$

() $G(s) = \frac{2 + 4e^{-s} + 8e^{-2s}}{s^2}$

() $F(s) = \frac{1 + e^{-s} + e^{-2s}}{s^2}$

() $G(s) = \frac{2 + 2e^{-s} + 4e^{-2s}}{s^2}$

(x) $F(s) = \frac{1 + e^{-s} + e^{-2s}}{s}$

() $G(s) = \frac{2 + 4e^{-s} + 8e^{-2s}}{s}$

() $F(s) = \frac{1 + 2e^{-s} + 3e^{-2s}}{s}$

(x) $G(s) = \frac{2 + 2e^{-s} + 4e^{-2s}}{s}$

() Nenhuma das anteriores.

() Nenhuma das anteriores.

- **Questão 4** (1.0 ponto) Sabendo que $y(t)$ satisfaz $y(t) = 2 - e^t + e^{-t} + \int_0^t (1+\tau)y(t-\tau)d\tau$ Assinale as alternativas que indicam respectivamente uma expressão para $Y(s) := \mathcal{L}\{y(t)\}$ e $y(t)$.

(x) $Y(s) = \frac{2s}{s^2 - 1}$

() $y(t) = \sin(2t)$

() $Y(s) = \frac{2}{s^2 - 1}$

() $y(t) = \cos(2t)$

() $Y(s) = \frac{2}{s^2 + 1}$

() $y(t) = e^t - e^{-t}$

() $Y(s) = \frac{2s}{s^2 + 1}$

(x) $y(t) = e^t + e^{-t}$

() Nenhuma das anteriores.

() Nenhuma das anteriores.

- **Questão 5** (1.0 ponto) Sabendo que $f(t) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \delta(t-k)$ e $g(t) = \int_0^t f(\tau)d\tau$. Assinale as alternativas que indicam respectivamente $f(7/2)$ e $g(7/2)$

() 0

() 9/2

(x) 1

() 11/2

() 2

(x) 13/2

() 3

() 15/2

() 4

() 17/2


- **Questão 6** (2.0 pontos) Considere a função $f_a : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f_a(t) = a \sum_{n=1}^{\infty} u(t - an).$$

onde a é uma constante positiva.

- (0.5) Esboce o gráfico de $f_a(t)$.
- (1.5) Calcule $F_a(s) = \mathcal{L}\{f_a(t)\}$. Calcule o limite $F_a(s)$ quando $a \rightarrow 0+$ e interprete o resultado.

Gráfico com $a = 1/2$ com reta $f(t) = t$



$$F_a(s) = a \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-ans}}{s} = \frac{a}{s} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-ans} = \frac{a}{s} \frac{e^{-as}}{1 - e^{-as}}$$

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow 0+} F_a(s) &= \lim_{a \rightarrow 0+} \frac{a}{s} \frac{e^{-as}}{1 - e^{-as}} \\ &= \frac{1}{s} \lim_{a \rightarrow 0+} \frac{a}{1 - e^{-as}} \\ &= \frac{1}{s} \lim_{a \rightarrow 0+} \frac{1}{se^{-as}} = \frac{1}{s^2} \end{aligned}$$

Onde se usou o teorema de L'Hôpital na última igualdade.

Nota-se que $f_a(t) \rightarrow t$ e $F(s) \rightarrow \frac{1}{s^2} = \mathcal{L}\{t\}$.

• Questão 7 (3.0 pontos)

$$\begin{aligned}x''(t) &= -4x(t) \\y'(t) &= -y(t) + x(t)\end{aligned}$$

Com condições iniciais dadas por $x(0) = 0$, $x'(0) = 1$ e $y(0) = 0$.

- a) (1.0) Escreva as transformadas de laplace, $X(s)$ e $Y(s)$, respectivamente de $x(t)$ e $y(t)$
- b) (1.0) Encontre uma expressão para $x(t)$ e esboce o gráfico.
- b) (1.0) Encontre uma expressão para $y(t)$.

$$s^2 X(s) - 1 + 4X(s) = 0$$

Assim $X(s) = \frac{1}{s^2 + 4}$ e $x(t) = \frac{1}{2} \sin(2t)$ Agora calculamos:

$$\begin{aligned}sY(s) + &= -Y(s) + \frac{1}{s^2 + 4} \\Y(s)(s+1) &= \frac{1}{s^2 + 4} = \frac{s^2 + 5}{s^2 + 4} \\Y(s) &= \frac{1}{(s^2 + 4)(s+1)} \\Y(s) &= \frac{A}{s+1} + \frac{Bs+C}{s^2 + 4} \\Y(s) &= \frac{1}{5} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{5} \frac{1-s}{s^2 + 4}\end{aligned}$$

Portanto $y(t) = \frac{1}{5}e^{-t} - \frac{1}{5} \cos(2t) + \frac{1}{10} \sin(2t)$