

1 - 2	3	4	Total

Nome: _____ Cartão: _____ Turma: C

Regras Gerais:

- Não é permitido o uso de calculadoras, telefones ou qualquer outro recurso computacional ou de comunicação.
- Trabalhe individualmente e sem uso de material de consulta além do fornecido.
- Devolva o caderno de questões preenchido ao final da prova.

Regras para as questões abertas:

- Seja sucinto, completo e claro.
- Justifique todo procedimento usado.
- Indique identidades matemáticas usadas, em especial, itens da tabela.
- Use notação matemática consistente.

Identidades:

$\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$	$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$
$\operatorname{senh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
$(a+b)^n = \sum_{j=0}^{\infty} \binom{n}{j} a^{n-j} b^j, \quad \binom{n}{j} = \frac{n!}{j!(n-j)!}$	
	$\sin(x+y) = \sin(x)\cos(y) + \sin(y)\cos(x)$
	$\cos(x+y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y)$

Propriedades:

1	Linearidade	$\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha \mathcal{L}\{f(t)\} + \beta \mathcal{L}\{g(t)\}$
2	Transformada da derivada	$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0)$ $\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2\mathcal{L}\{f(t)\} - sf(0) - f'(0)$
3	Deslocamento no eixo s	$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$
4	Deslocamento no eixo t	$\mathcal{L}\{u(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}F(s)$ $\mathcal{L}\{u(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s}$
5	Transformada da integral	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$
6	Filtragem da Delta de Dirac	$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-a)dt = f(a)$
7	Transformada da Delta de Dirac	$\mathcal{L}\{\delta(t-a)\} = e^{-as}$
8	Teorema da Convolução	$\mathcal{L}\{(f*g)(t)\} = F(s)G(s),$ onde $(f*g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$
9	Transformada de funções periódicas	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1-e^{-sT}} \int_0^T e^{-s\tau} f(\tau)d\tau$
10	Derivada da transformada	$\mathcal{L}\{tf(t)\} = -\frac{dF(s)}{ds}$
11	Integral da transformada	$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^{\infty} F(\hat{s})d\hat{s}$

Séries:

$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 \dots, \quad -1 < x < 1$
$\frac{x}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x + 2x^2 + 3x^3 + \dots, \quad -1 < x < 1$
$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, \quad -\infty < x < \infty$
$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad -1 < x < 1$
$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad -1 < x < 1$
$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad -\infty < x < \infty$
$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad -\infty < x < \infty$
$\operatorname{senh}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad -\infty < x < \infty$
$\cosh(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad -\infty < x < \infty$
$(1+x)^m = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!} x^n, \quad -1 < x < 1, m \neq 0, 1, 2, \dots$

Funções especiais:

Função Gamma	$\Gamma(k) = \int_0^{\infty} x^{k-1} e^{-x} dx$
Propriedade da Função Gamma	$\Gamma(k+1) = k\Gamma(k), \quad k > 0$ $\Gamma(n+1) = n!, \quad n \in \mathbb{N}$
Função de Bessel modificada de ordem ν	$I_{\nu}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!\Gamma(m+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+\nu}$
Função de Bessel de ordem 0	$J_0(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!2^m} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m}$
Integral seno	$\text{Si}(t) = \int_0^t \frac{\sin(x)}{x} dx$

Integrais:

$\int xe^{\lambda x} dx = \frac{e^{\lambda x}}{\lambda^2} (\lambda x - 1) + C$
$\int x^2 e^{\lambda x} dx = e^{\lambda x} \left(\frac{x^2}{\lambda} - \frac{2x}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda^3} \right) + C$
$\int x^n e^{\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda} x^n e^{\lambda x} - \frac{n}{\lambda} \int x^{n-1} e^{\lambda x} dx + C$
$\int x \cos(\lambda x) dx = \frac{\cos(\lambda x) + \lambda x \sin(\lambda x)}{\lambda^2} + C$
$\int x \sin(\lambda x) dx = \frac{\sin(\lambda x) - \lambda x \cos(\lambda x)}{\lambda^2} + C$
$\int e^{\lambda x} \sin(wx) dx = \frac{e^{\lambda x} (\lambda \sin(wx) - w \cos(wx))}{\lambda^2 + w^2}$

Tabela de transformadas de Laplace:

	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$	$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$
1	$\frac{1}{s}$	1
2	$\frac{1}{s^2}$	t
3	$\frac{1}{s^n}, \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$
4	$\frac{1}{\sqrt{s}},$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}$
5	$\frac{1}{s^{\frac{3}{2}}},$	$2\sqrt{\frac{t}{\pi}}$
6	$\frac{1}{s^k}, \quad (k > 0)$	$\frac{t^{k-1}}{\Gamma(k)}$
7	$\frac{1}{s-a}$	e^{at}
8	$\frac{1}{(s-a)^2}$	te^{at}
9	$\frac{1}{(s-a)^n}, \quad (n = 1, 2, 3\dots)$	$\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}e^{at}$
10	$\frac{1}{(s-a)^k}, \quad (k > 0)$	$\frac{1}{\Gamma(k)}t^{k-1}e^{at}$
11	$\frac{1}{(s-a)(s-b)}, \quad (a \neq b)$	$\frac{1}{a-b}(e^{at} - e^{bt})$
12	$\frac{s}{(s-a)(s-b)}, \quad (a \neq b)$	$\frac{1}{a-b}(ae^{at} - be^{bt})$
13	$\frac{1}{s^2 + w^2}$	$\frac{1}{w} \operatorname{sen}(wt)$
14	$\frac{s}{s^2 + w^2}$	$\cos(wt)$
15	$\frac{1}{s^2 - a^2}$	$\frac{1}{a} \operatorname{senh}(at)$
16	$\frac{s}{s^2 - a^2}$	$\cosh(at)$
17	$\frac{1}{(s-a)^2 + w^2}$	$\frac{1}{w}e^{at} \operatorname{sen}(wt)$
18	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + w^2}$	$e^{at} \cos(wt)$
19	$\frac{1}{s(s^2 + w^2)}$	$\frac{1}{w^2}(1 - \cos(wt))$
20	$\frac{1}{s^2(s^2 + w^2)}$	$\frac{1}{w^3}(wt - \operatorname{sen}(wt))$
21	$\frac{1}{(s^2 + w^2)^2}$	$\frac{1}{2w^3}(\operatorname{sen}(wt) - wt \cos(wt))$
22	$\frac{s}{(s^2 + w^2)^2}$	$\frac{t}{2w} \operatorname{sen}(wt)$
23	$\frac{s^2}{(s^2 + w^2)^2}$	$\frac{1}{2w}(\operatorname{sen}(wt) + wt \cos(wt))$
24	$\frac{s}{(s^2 + a^2)(s^2 + b^2)}, \quad (a^2 \neq b^2)$	$\frac{1}{b^2 - a^2}(\cos(at) - \cos(bt))$
25	$\frac{1}{(s^4 + 4a^4)}$	$\frac{1}{4a^3}[\operatorname{sen}(at) \cosh(at) - \cos(at) \operatorname{senh}(at)]$
26	$\frac{s}{(s^4 + 4a^4)}$	$\frac{1}{2a^2} \operatorname{sen}(at) \operatorname{senh}(at))$
27	$\frac{1}{(s^4 - a^4)}$	$\frac{1}{2a^3}(\operatorname{senh}(at) - \operatorname{sen}(at))$
28	$\frac{s}{(s^4 - a^4)}$	$\frac{1}{2a^2}(\cosh(at) - \cos(at))$

	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$	$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$
29	$\sqrt{s-a} - \sqrt{s-b}$	$\frac{1}{2\sqrt{\pi t^3}}(e^{bt} - e^{at})$
30	$\frac{1}{\sqrt{s+a}\sqrt{s+b}}$	$e^{-\frac{(a+b)t}{2}} I_0\left(\frac{a-b}{2}t\right)$
31	$\frac{1}{\sqrt{s^2 + a^2}}$	$J_0(at)$
32	$\frac{s}{(s-a)^{\frac{3}{2}}}$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}e^{at}(1+2at)$
33	$\frac{1}{(s^2 - a^2)^k}, \quad (k > 0)$	$\frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(k)}\left(\frac{t}{2a}\right)^{k-\frac{1}{2}} I_{k-\frac{1}{2}}(at)$
34	$\frac{1}{s}e^{-\frac{k}{s}}, \quad (k > 0)$	$J_0(2\sqrt{kt})$
35	$\frac{1}{\sqrt{s}}e^{-\frac{k}{s}}$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \cos(2\sqrt{kt})$
36	$\frac{1}{s^{\frac{3}{2}}}e^{\frac{k}{s}}$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \operatorname{senh}(2\sqrt{kt})$
37	$e^{-k\sqrt{s}}, \quad (k > 0)$	$\frac{k}{2\sqrt{\pi t^3}}e^{-\frac{k^2}{4t}}$
38	$\frac{1}{s} \ln(s)$	$-\ln(t) - \gamma, \quad (\gamma \approx 0,5772)$
39	$\ln\left(\frac{s-a}{s-b}\right)$	$\frac{1}{t}(e^{bt} - e^{at})$
40	$\ln\left(\frac{s^2 + w^2}{s^2}\right)$	$\frac{2}{t}(1 - \cos(wt))$
41	$\ln\left(\frac{s^2 - a^2}{s^2}\right)$	$\frac{2}{t}(1 - \cosh(at))$
42	$\tan^{-1}\left(\frac{w}{s}\right)$	$\frac{1}{t} \operatorname{sen}(wt)$
43	$\frac{1}{s} \cot^{-1}(s)$	$\operatorname{Si}(t)$
44	$\frac{1}{s} \tanh\left(\frac{as}{2}\right)$	Onda quadrada $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < a \\ -1, & a < t < 2a \end{cases}$ $f(t+2a) = f(t), \quad t > 0$
45	$\frac{1}{as^2} \tanh\left(\frac{as}{2}\right)$	Onda triangular $f(t) = \begin{cases} \frac{t}{a}, & 0 < t < a \\ -\frac{t}{a} + 2, & a < t < 2a \end{cases}$ $f(t+2a) = f(t), \quad t > 0$
46	$\frac{w}{(s^2 + w^2)\left(1 - e^{-\frac{\pi}{w}s}\right)}$	Retificador de meia onda $f(t) = \begin{cases} \operatorname{sen}(wt), & 0 < t < \frac{\pi}{w} \\ 0, & \frac{\pi}{w} < t < \frac{2\pi}{w} \end{cases}$ $f\left(t + \frac{2\pi}{w}\right) = f(t), \quad t > 0$
47	$\frac{w}{s^2 + w^2} \coth\left(\frac{\pi s}{2w}\right)$	Retificador de onda completa $f(t) = \operatorname{sen}(wt) $
48	$\frac{1}{as^2} - \frac{e^{-as}}{s(1-e^{-as})}$	Onda dente de serra $f(t) = \frac{t}{a}, \quad 0 < t < a$ $f(t) = f(t-a), \quad t > a$

• **Questão 1** (0.5 cada item) Considere a transformada de Laplace das funções $f(t)$ e $g(t)$ dadas nas expressões abaixo:

$$F(s) = \frac{5s}{(s^2 + 4)(s - 1)}$$

e

$$G(s) = \frac{5se^{-2s}}{(s^2 + 4)(s - 1)}$$

Também, considere $h(t) = f(t) + g(t)$.

Na primeira coluna, marque a alternativa que apresenta uma expressão para $F(s)$ separada da forma $F(s) = \frac{A + Bs}{s^2 + 4} + \frac{C}{s - 1}$. Na segunda coluna, marque a alternativa que apresenta uma expressão para $f(t)$. Na terceira, marque a alternativa que apresenta uma expressão para $h(t)$. E, na quarta, marque a alternativa que apresenta a transformada de Laplace de $h'(t)$.
 F(s):

() $F(s) = \frac{3 - 2s}{s^2 + 4} + \frac{1}{s - 1}$.

$f(t)$:

() $F(s) = \frac{2 + 3s}{5(s^2 + 4)} + \frac{1}{5(s - 1)}$.

() $f(t) = \frac{2}{5} \operatorname{sen}(2t) - \frac{1}{5} \cos(2t) + \frac{1}{5}e^t$.

() $F(s) = \frac{4 - s}{5(s^2 + 4)} + \frac{1}{5(s - 1)}$.

() $f(t) = 10 \operatorname{sen}(2t) + 5 \cos(2t) + 5e^t$.

() $F(s) = \frac{2 + 3s}{s^2 + 4} + \frac{1}{s - 1}$.

() $f(t) = 2 \operatorname{sen}(2t) - \cos(2t) + e^t$.

() $F(s) = \frac{4 - s}{s^2 + 4} + \frac{1}{s - 1}$.

() $f(t) = \operatorname{sen}(2t) + 3 \cos(2t) + e^t$.

() $f(t) = 4 \operatorname{sen}(2t) - \cos(2t) + e^t$.

$\mathcal{L}\{h'(t)\}$:

$h(t)$:

() $\mathcal{L}\{h'(t)\} = \frac{5s^2 + 5e^{-2s}}{(s^2 + 4)(s - 1)}$

() $h(t) = 2 \operatorname{sen}(2t) - \cos(2t) + e^t + (2 \operatorname{sen}(2t) - \cos(2t) + e^t)u(t - 2)$.

() $h(t) = 2 \operatorname{sen}(2t) - \cos(2t) + e^t + (2 \operatorname{sen}(2(t - 2)) - \cos(2(t - 2)) + e^{(t-2)})u(t - 2)$. () $\mathcal{L}\{h'(t)\} = \frac{5 + 5e^{-2s}}{s(s^2 + 4)(s - 1)}$

() $h(t) = \operatorname{sen}(2t) + 3 \cos(2t) + e^t + (\operatorname{sen}(2(t - 2)) + 3 \cos(2(t - 2)) + e^{(t-2)})u(t - 2)$.

() $\mathcal{L}\{h'(t)\} = \frac{5 + 5e^{-2s}}{(s^2 + 4)(s - 1)}$

() $h(t) = \operatorname{sen}(2t) + 3 \cos(2t) + e^t + (\operatorname{sen}(2t) + 3 \cos(2t) + e^t)u(t - 2)$.

() $h(t) = \frac{2 \operatorname{sen}(2t)}{5} - \frac{\cos(2t)}{5} + \frac{e^t}{5} + \frac{u(t - 2)}{5}(2 \operatorname{sen}(2(t - 2)) - \cos(2(t - 2)) + e^{(t-2)})$. () $\mathcal{L}\{h'(t)\} = \frac{5s^2 + 5s^2e^{-2s}}{(s^2 + 4)(s - 1)}$

() $\mathcal{L}\{h'(t)\} = \frac{5s + 5se^{-2s}}{(s^2 + 4)(s - 1)}$

• **Questão 2** (0.5 cada item) Considere a transformada de Laplace da função $f(t)$ dada na expressão abaixo:

$$F(s) = \frac{s^2 + 1}{105 + 71s + 15s^2 + s^3}$$

Observe que o objetivo aqui não é calcular a transformada inversa.

Na primeira coluna, marque a alternativa que apresenta uma expressão para a transformada de $g(t) := \int_0^t f(\tau) d\tau$. Na segunda coluna, marque a alternativa que apresenta o limite $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$. Na terceira, marque a alternativa que apresenta uma expressão para $\mathcal{L}\{e^{3t}f(t)\}$. E, na quarta, marque a alternativa que apresenta a transformada de Laplace de $tf(t)$.

$\mathcal{L}\{g(t)\} = \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\}:$

() $\frac{s^2 + 1}{105s + 71s^2 + 15s^3 + s^4}$

() $\frac{s^3 + s}{105 + 71s + 15s^2 + s^3}$

() $\frac{2s}{71 + 30s + 3s^2}$

() $\int_s^\infty \left(\frac{v^2 + 1}{105 + 71v + 15v^2 + v^3} \right) dv$

() $\frac{s^2 + 1}{105 + 71s + 15s^2 + s^3}$

$\lim_{t \rightarrow 0} f(t):$

() $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = 0.$

() $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \frac{1}{105}.$

() $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \frac{1}{71}.$

() $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \frac{1}{15}.$

() $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = 1.$

$\mathcal{L}\{e^{3t}f(t)\}:$

() $(s - 3) \frac{s^2 + 1}{105 + 71s + 15s^2 + s^3}.$

() $e^{-3s} \frac{s^2 + 1}{105 + 71s + 15s^2 + s^3}.$

() $u(s - 3) \frac{s^2 + 1}{105 + 71s + 15s^2 + s^3}.$

() $\frac{(s + 3)^2 + 1}{105 + 71(s + 3) + 15(s + 3)^2 + (s + 3)^3}.$

() $\frac{(s - 3)^2 + 1}{105 + 71(s - 3) + 15(s - 3)^2 + (s - 3)^3}.$

$\mathcal{L}\{tf(t)\}:$

() $\frac{(-71 + 180s + 68s^2 - s^4)}{(105 + 71s + 15s^2 + s^3)}.$

() $-\frac{1}{(105 + 71s + 15s^2 + s^3)^2}.$

() $-\frac{(-71 + 180s + 68s^2 - s^4)}{(105 + 71s + 15s^2 + s^3)^2}.$

() $-\frac{s^2 + 1}{105 + 71s + 15s^2 + s^3}.$

() $-\frac{2s}{71 + 15s + 3s^2}.$

- **Questão 3** (3.0 pontos) Um sistema mecânico com massa m , coeficiente de amortecimento c e constante de mola k é representado pela seguinte equação diferencial:

$$2y''(t) + cy'(t) + 50y(t) = f(t)$$

onde $f(t)$ é uma força externa aplicada ao sistema. Considere que $f(t) = 1$.

- a) (1.0 ponto) Encontre os intervalos para o amortecimento c para cada um dos três regimes de amortecimento (superamortecido, subamortecido e criticamente amortecido). Escreva a forma geral da solução e um gráfico qualitativo para cada regime descrito.
- b) (0.5) Explique o caso $c = 0$.
- c) (0.5) Encontre $Y(s)$ para o caso criticamente amortecido com $y(0) = 0$ e $y'(0) = 1$.
- d) (0.5) Encontre $y(t)$ para o caso específico dado.
- e) (0.5) Trace o gráfico de $y(t)$ para o caso específico dado, indicando eixos e valores notáveis.

- **Questão 4** (3.0 pontos) A temperatura em um sistema de refrigeração evolui no tempo conforme o seguinte modelo simplificado:

$$\frac{du(t)}{dt} = -\lambda(u(t) - u_{amb}) + q(t) \quad (1)$$

onde $u(t)$ representa a temperatura medida, u_{amb} é temperatura ambiente, considerada constante, $q(t)$ é a potência do sistema (negativa) e λ é uma constante relacionada às trocas de calor. Considere $u(0) = 20$, $u_{amb} = 20$ e $\lambda = 2$.

A temperatura é regulada por um sistema de controle automático que ajusta a potência $q(t)$. O sistema de controle automático reage conforme a seguinte equação:

$$\frac{dq(t)}{dt} = \eta(u_a - u(t)). \quad (2)$$

onde u_a é a temperatura de ajuste, η é uma constante positiva e $q(0) = 0$. Calcule o valor de η para que o sistema resultante do acoplamento entre o modelo do sistema de refrigeração e o sistema de controle automático seja criticamente amortecido.

Usando a técnicas das transformadas de Laplace, faça o que se pede:

- (1.0) Encontre uma expressão geral para $U(s)$ e calcule η tal que o sistema acoplado seja criticamente amortecido.
- (1.0) Resolva o problema acoplado para $u(t)$ usando a constante η calculada no item a) e considerando $u_a = 0$.
- (1.0) Resolva o problema acoplado para $q(t)$ usando a constante η calculada no item a) e considerando $u_a = 0$.