

| 1 - 3 | 4 | 5 | Total |
|-------|---|---|-------|
|       |   |   |       |

Nome: GABARITO

Cartão:

- Questão 1. Considere  $y(t)$  tal que  $\begin{cases} y' + 2y = e^{-2t}, & t > 0 \\ y(0) = 2 \end{cases}$  e sua transformada de Laplace  $Y(s)$ .

É correto: (1.0pt)

( )  $Y(s) = \frac{1}{(s+2)^2}$

(X)  $Y(s) = \frac{2}{s+2} + \frac{1}{(s+2)^2}$

( )  $Y(s) = \frac{2}{s} + \frac{1}{(s+2)^2}$

( )  $Y(s) = -\frac{2}{s+2} + \frac{1}{(s+2)^2}$

( ) nenhuma das anteriores

É correto: (1.0pt)

(X)  $y(t) = 2e^{-2t} + te^{-2t}$

( )  $y(t) = te^{-2t}$

( )  $y(t) = 2 + te^{-2t}$

( )  $y(t) = -2e^{-2t} + te^{-2t}$

( )  $y(t) = 2e^{-2t} + \frac{t^2 e^{-2t}}{2}$

( ) nenhuma das anteriores

**Solução:**

$$\begin{aligned} sY - 2 + 2Y &= \frac{1}{s+2} \Rightarrow (s+2)Y = 2 + \frac{1}{s+2} \Rightarrow Y = \frac{2}{s+2} + \frac{1}{(s+2)^2} \\ \Rightarrow y(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left( \frac{2}{s+2} + \frac{1}{(s+2)^2} \right) = 2e^{-2t} + te^{-2t} \end{aligned}$$

- Questão 2. Seja  $y(t)$  tal que  $\begin{cases} y'' - y = e^{-t}, & t > 0 \\ y(0) = 0, y'(0) = 0 \end{cases}$  e sua transformada de Laplace  $Y(s)$ .

É correto: (1.0pt)

(X)  $Y(s) = \frac{1}{(s-1)(s+1)^2}$

( )  $Y(s) = \frac{1}{(s-1)^3}$

( )  $Y(s) = \frac{1}{s^3 - 1}$

( )  $Y(s) = \frac{1}{(s-1)^2(s+1)}$

( ) nenhuma das anteriores

É correto: (1.0pt)

( )  $y(t) = -\frac{e^{-t}}{4} + \frac{te^{-t}}{2} + \frac{e^t}{4}$

(X)  $y(t) = -\frac{e^{-t}}{4} - \frac{te^{-t}}{2} + \frac{e^t}{4}$

( )  $y(t) = \frac{e^{-t}}{4} - \frac{te^{-t}}{2} + \frac{e^t}{4}$

( )  $y(t) = \frac{t^2 e^t}{2}$

( )  $y(t) = \frac{te^{-t}}{2}$

( ) nenhuma das anteriores

**Solução:** (a)

$$s^2Y - s(0) - 0 - Y = \frac{1}{s+1} \Rightarrow (s^2 - 1)Y = \frac{1}{s+1} \Rightarrow Y = \frac{1}{(s-1)(s+1)(s+1)} = \frac{1}{(s-1)(s+1)^2}$$

(b) Decomposição em frações parciais

$$\begin{aligned} \frac{1}{(s-1)(s+1)^2} &= \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{(s+1)^2} = \frac{A(s+1)^2 + B(s-1)(s+1) + C(s-1)}{(s-1)(s+1)^2} \\ \Leftrightarrow 1 &= A(s+1)^2 + B(s-1)(s+1) + C(s-1) \quad \forall s \\ s = -1 \Rightarrow 1 &= C(-1-1) \Rightarrow C = -1/2 \end{aligned}$$

$$s = 1 \Rightarrow 1 = A(1+1)^2 \Rightarrow A = 1/4$$

$$s = 0 \Rightarrow 1 = A(1) + B(-1) + C(-1) \Rightarrow B = -1 + A - C = -1 + 1/4 + 1/2 = -1/4$$

e segue

$$Y(s) = \frac{1}{(s-1)(s+1)^2} = \frac{1/4}{s-1} - \frac{1/4}{s+1} + \frac{-1/2}{(s+1)^2}$$

$$y(t) = -\frac{e^{-t}}{4} - \frac{te^{-t}}{2} + \frac{e^t}{4}$$


---

- **Questão 3.** (A) (1.0pt) O PVI impulsivo com condições iniciais nulas  $\begin{cases} y'' + 3y = 3\delta(t) \\ y(0) = 0, y'(0) = 0 \end{cases}$  é equivalente (dois PVIs são equivalentes quando suas soluções possuem a mesma transformada de Laplace) a qual dos abaixo:
 

|   |  |
|---|--|
| $(\ ) \begin{cases} y'' + 3y = 0 \\ y(0) = 3, y'(0) = 3 \end{cases}$  | $(\ ) \begin{cases} y'' + 3y = 0 \\ y(0) = e^3, y'(0) = 0 \end{cases}$ |
| $(\ ) \begin{cases} y'' + 3y = 0 \\ y(0) = 0, y'(0) = 1 \end{cases}$  | $(\ ) \begin{cases} y'' + 3y = 0 \\ y(0) = 0, y'(0) = e^3 \end{cases}$ |
| $(\ ) \begin{cases} y'' + 3y = 0 \\ y(0) = 0, y'(0) = -3 \end{cases}$ | (X) nenhum dos anteriores  |

**Solução:** a transformada de Laplace do sistema do enunciado:

$$s^2Y + 3Y = 3(1) \Rightarrow Y(s) = \frac{3}{s^2 + 3}$$

que é transformada de Laplace de  $y$  satisfazendo  $\begin{cases} y'' + 3y = 0 \\ y(0) = 0, y'(0) = 3 \end{cases}$  e nenhuma outra das opções.

---

- (B) (1.0pt) Sobre o regime de amortecimento do oscilador  $\begin{cases} y'' + 4y' + 3y = 1 \\ y(0) = 0, y'(0) = 1 \end{cases}$ , é correto afirmar:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| (X) é superamortecido            | $(\ )$ é não-amortecido                    |
| $(\ )$ é subamortecido           | $(\ )$ é assintoticamente amortecido       |
| $(\ )$ é criticamente amortecido | $(\ )$ nenhuma das anteriores está correta |

**Solução:**  $my'' + \gamma y' + \kappa y = 0$  onde

$$\kappa - \frac{\gamma^2}{4m} = 3 - \frac{4^2}{4(1)} = 3 - 4 < 0$$

então o sistema é superamortecido.

---

- **Questão 4.** Sejam  $y(t)$  tal que  $\begin{cases} y' + y = 2\cos(t), t > 0 \\ y(0) = 0 \end{cases}$  e sua transformada de Laplace  $Y(s)$ .

(A) É correto: (1.0pt)

$$(\ ) Y(s) = \frac{2s}{s^3 + 1}$$

$$(\ ) Y(s) = \frac{2}{(s+1)(s^2 + 1)}$$

$$(\ ) Y(s) = \frac{2s}{(s+1)^3}$$

$$(\ ) Y(s) = \frac{2}{(s+1)^3}$$

$$(X) Y(s) = \frac{2s}{(s+1)(s^2 + 1)}$$

$(\ )$  nenhuma das anteriores

(B) (1.0pt) Obtenha  $y(t)$  usando sua transformada de Laplace  $Y(s)$ .

**Solução:** (A)

$$sY - 0 + Y = \frac{2s}{s^2 + 1} \Rightarrow Y = \frac{2s}{(s+1)(s^2+1)}$$

(B) decomposição de frações parciais

$$\frac{2s}{(s+1)(s^2+1)} = \frac{A}{s+1} + \frac{Bs+C}{s^2+1} = \frac{A(s^2+1) + (Bs+C)(s+1)}{(s+1)(s^2+1)}$$

implica  $2s = A(s^2 + 1) + (Bs + C)(s + 1)$  para todo  $s$

$s = -1$  implica  $-2 = A(2) + 0 \Rightarrow A = -1$

$s = 0$  implica  $0 = A(1) + C(1) \Rightarrow C = -A = 1$

$s = 1$  implica  $2 = A(2) + B(2) + C(2) \Rightarrow B = 1 - A - C \Rightarrow B = 1$

Finalmente  $y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(-\frac{1}{s+1} + \frac{s+1}{s^2+1}\right) = -e^t + \cos(t) + \sin(t)$


- **Questão 5** Seja  $a$  um parâmetro positivo. Considere o seguinte problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y' + 2y = f(t) & , t > 0 \\ y(0) = 0 \end{cases} \text{ onde } f(t), \text{ que depende de } a, \text{ é determinada como abaixo:}$$

(A).(1.0pt) Obtenha  $F(s) = \mathcal{L}(f)$  para  $a > 0$ .

(B).(1.0pt) Obtenha a solução  $y(t)$ , usando a resposta da parte (A), para  $a = 1$ .

Bom Trabalho



Solução: (A)

$$f'(t) = \begin{cases} 1 & , 0 < t < a \\ 0 & , t > a \end{cases} \Rightarrow \mathcal{L}(f') = \int_0^a (1)e^{-st} dt = \left[ \frac{e^{-st}}{-s} \right]_0^a = \frac{1 - e^{-sa}}{s}$$

Por outro lado:  $\mathcal{L}(f') = s\mathcal{L}(f) - 0 = s\mathcal{L}(f)$

$$\mathcal{L}(f) = \frac{\mathcal{L}(f')}{s} = \frac{1 - e^{-sa}}{s^2}$$

(B) Ainda

$$sY - 0 + 2Y = \mathcal{L}(f) \Rightarrow (s+2)Y = \frac{1 - e^{-sa}}{s^2} \Rightarrow Y = \frac{1 - e^{-sa}}{s^2(s+2)} \Rightarrow y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1 - e^{-sa}}{s^2(s+2)}\right)$$

e prosseguimos por etapas, de início aplicando a propriedade de transformada da integral

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s+2}\right) = e^{-2t} \Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s(s+2)}\right) = \int_0^t e^{-2u} du = \left[ \frac{e^{-2u}}{-2} \right]_0^t = \frac{1 - e^{-2t}}{2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2(s+2)}\right) = \int_0^t \frac{1 - e^{-2u}}{2} du = \left[ \frac{u}{2} + \frac{e^{-2u}}{4} \right]_0^t = \frac{t}{2} + \frac{e^{-2t} - 1}{4}$$

Fazendo  $a = 1$ , temos

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1 - e^{-s}}{s^2(s+2)}\right) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2(s+2)}\right) - \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{e^{-s}}{s^2(s+2)}\right) = \\ &= \frac{t}{2} + \frac{e^{-2t} - 1}{4} - u(t-1) \left( \frac{t-1}{2} + \frac{e^{-2(t-1)} - 1}{4} \right) \end{aligned}$$

onde  $u(\cdot)$  é a função degrau unitário.

□