

1-6	7	8	Total

Nome: _____ Cartão: _____

Regras Gerais:

- Não é permitido o uso de calculadoras, telefones ou qualquer outro recurso computacional ou de comunicação.
- Trabalhe individualmente e sem uso de material de consulta além do fornecido.
- Devolva o caderno de questões preenchido ao final da prova.

Regras para as questões abertas

- Seja sucinto, completo e claro.
- Justifique todo procedimento usado.
- Indique identidades matemáticas usadas, em especial, itens da tabela.
- Use notação matemática consistente.

Tabela do operador $\vec{\nabla}$:

$f = f(x, y, z)$ e $g = g(x, y, z)$ são funções escalares;
 $\vec{F} = \vec{F}(x, y, z)$ e $\vec{G} = \vec{G}(x, y, z)$ são funções vetoriais.

1.	$\vec{\nabla}(f + g) = \vec{\nabla}f + \vec{\nabla}g$
2.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{F} + \vec{G}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} + \vec{\nabla} \cdot \vec{G}$
3.	$\vec{\nabla} \times (\vec{F} + \vec{G}) = \vec{\nabla} \times \vec{F} + \vec{\nabla} \times \vec{G}$
4.	$\vec{\nabla}(fg) = f\vec{\nabla}g + g\vec{\nabla}f$
5.	$\vec{\nabla} \cdot (f\vec{F}) = (\vec{\nabla}f) \cdot \vec{F} + f(\vec{\nabla} \cdot \vec{F})$
6.	$\vec{\nabla} \times (f\vec{F}) = \vec{\nabla}f \times \vec{F} + f\vec{\nabla} \times \vec{F}$
7.	$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}f = \vec{\nabla}^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2},$ onde $\vec{\nabla}^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ é o operador laplaciano
8.	$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}f) = 0$
9.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = 0$
10.	$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) - \vec{\nabla}^2 \vec{F}$
11.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = G \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) - F \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{G})$
12.	$\vec{\nabla} \times (\vec{F} \times \vec{G}) = (\vec{G} \cdot \vec{\nabla}) \vec{F} - \vec{G}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) - (\vec{F} \cdot \vec{\nabla}) \vec{G} + \vec{F}(\vec{\nabla} \cdot \vec{G})$
13.	$\vec{\nabla}(\vec{F} \cdot \vec{G}) = (\vec{G} \cdot \vec{\nabla}) \vec{F} + (\vec{F} \cdot \vec{\nabla}) \vec{G} + \vec{F} \times (\vec{\nabla} \times \vec{G}) + \vec{G} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F})$

Curvatura, torção e aceleração:

Nome	Definição
Curvatura	$\kappa = \left\ \frac{d\vec{T}}{ds} \right\ = \left\ \frac{d\vec{T}}{dt} \right\ = \frac{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ }{\ \vec{r}'(t)\ ^3}$
Torção	$\tau = -\frac{d\vec{B}}{ds} \cdot \vec{N} = \frac{(\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)) \cdot \vec{r}'''(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ ^2}$
Módulo da Torção	$ \tau = \left\ \frac{d\vec{B}}{ds} \right\ = \left\ \frac{d\vec{B}}{dt} \right\ $
Aceleração normal	$a_N = \frac{\ \vec{a} \times \vec{v}\ }{v} = \frac{v^2}{\rho} = \kappa v^2$
Aceleração tangencial	$a_T = \frac{\vec{a} \cdot \vec{v}}{v} = \frac{dv}{dt}$


Equações de Frenet-Serret:

$\frac{d\vec{T}}{ds} = \kappa \vec{N}$
$\frac{d\vec{N}}{ds} = -\kappa \vec{T} + \tau \vec{B}$
$\frac{d\vec{B}}{ds} = -\tau \vec{N}$

- **Questão 1** (1.0 ponto) Considere as curvas C_1 , C_2 , C_3 e C_4 , com curvaturas κ_1 , κ_2 , κ_3 e κ_4 , respectivamente. Todas as curvas são circunferências ou reta. Na primeira coluna, marque o item que apresenta todas as curvas com curvatura constante e, na segunda, a magnitude das curvaturas no ponto de encontro entre todas as curvas.

Curvas com curvatura constante Curvatura no ponto de encontro de todas as curvas

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Somente C_4 . | <input type="checkbox"/> $\kappa_1 > \kappa_2 > \kappa_3 > \kappa_4$. |
| <input type="checkbox"/> Somente C_4 e C_1 . | <input type="checkbox"/> $\kappa_1 < \kappa_2 < \kappa_3 < \kappa_4$. |
| <input type="checkbox"/> Somente C_4 e C_2 . | <input checked="" type="checkbox"/> $\kappa_4 < \kappa_1 < \kappa_2 < \kappa_3$. |
| <input type="checkbox"/> Somente C_4 , C_3 e C_2 . | <input type="checkbox"/> $\kappa_4 > \kappa_1 > \kappa_2 > \kappa_3$. |
| <input type="checkbox"/> Somente C_4 , C_2 e C_1 . | <input type="checkbox"/> $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa_3 > \kappa_4$. |
| <input checked="" type="checkbox"/> C_4 , C_3 , C_2 e C_1 . | <input type="checkbox"/> $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa_3 < \kappa_4$. |



- **Questão 2** (1.0 ponto) Considere três pontos sobre a curva ao lado, nomeados de P_1 , P_2 e P_3 , dispostos respectivamente no sentido positivo da curva, e em cada ponto o esboço do triedro de Frenet-Serret. Considere um partícula se deslocando sobre a curva no sentido positivo com velocidade escalar estritamente crescente. Marque na primeira coluna o correto item sobre a aceleração da partícula e, na segunda, a correta afirmação sobre o sinal da torção em cada pedaço da curva.



Aceleração

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> A componente normal da aceleração é negativa. | |
| <input type="checkbox"/> A componente tangencial da aceleração é negativa. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> A componente tangencial da aceleração é positiva. | |
| <input type="checkbox"/> A norma do vetor aceleração é constante em todos os pontos. | |
| <input type="checkbox"/> A norma do vetor aceleração tem derivada zero em todos os pontos. | |

Torção

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> A torção é sempre positiva. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> A torção é sempre negativa. | |
| <input type="checkbox"/> A torção é positiva entre P_1 e P_2 e negativa entre P_2 e P_3 . | |
| <input type="checkbox"/> A torção é negativa entre P_1 e P_2 e positiva entre P_2 e P_3 . | |
| <input type="checkbox"/> A torção é zero nos pontos P_1 , P_2 e P_3 . | |

- **Questão 3** (1.0 ponto) Considere os campos dados por $\vec{F} = xi + xe^y\vec{j} + xyz\vec{k}$, $\vec{G} = \vec{\nabla}(\vec{F} \cdot \vec{F})$ e C a circunferência de raio 2 no plano xy centrada na origem. Marque na primeira coluna o campo $\vec{G} \cdot \vec{i}$ e, na segunda, o valor de $\int_C \vec{G} \cdot d\vec{r}$.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> $2x(1 + e^{2y} + y^2z^2)$ | <input checked="" type="checkbox"/> 0 |
| <input type="checkbox"/> $2(1 + e^{2y} + y^2z^2)$ | <input type="checkbox"/> 1 |
| <input type="checkbox"/> $2y(e^{2y} + y^2z)$ | <input type="checkbox"/> -1 |
| <input type="checkbox"/> $2z(1 + 2e^y + y^2z^2)$ | <input type="checkbox"/> 2 |
| <input type="checkbox"/> $2y(x + 2e^{2y} + yz^2)$ | <input type="checkbox"/> -2 |


- **Questão 4** (1.0 ponto) Considere a superfície S aberta dada na figura ao lado, limitada pelo curva C . A superfície S é dada por uma função $z = f(x, y)$, tem simetria axial em relação ao eixo z e o domínio de f é $[-1, 1] \times [-1, 1]$. A superfície S está orientada no sentido de \vec{k} e a curva C está positivamente orientada com respeito a S . Considere o campo $\vec{F} = (x+1)\vec{j} + 10\vec{k}$ e as seguintes integrais:

$$A = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

e

$$B = \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS.$$

Marque na primeira coluna o correto sinal de A e, na segunda, o correto sinal de B .



Sinal de A

- (X) $A > 0$.
 $A = 0$.
 $A < 0$.
 Embora $A \neq 0$, não é possível saber seu sinal.
 Não há informações suficientes para estimar A .

Sinal de B

- (X) $B > 0$.
 $B = 0$.
 $B < 0$.
 Embora $B \neq 0$, não é possível saber seu sinal.
 Não há informações suficientes para estimar B .

- **Questão 5** (1.0 ponto) Dado o campo conservativo $\vec{F} = (\cos(x) + 2xy^2z^2)\vec{i} + (2x^2yz^2)\vec{j} + (2x^2y^2z)\vec{k}$, marque na primeira coluna o pontencial $\phi(x, y, z)$ e, na segunda, o valor $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$, onde C é a curva $\vec{r} = \cos(\pi t)\vec{i} + \sin(\pi t)\vec{j} + 2t^2\vec{k}$, $0 \leq t \leq 1$.

- | | |
|---|--------------------------|
| (X) $\sin(x) + x^2y^2z^2$. | <input type="radio"/> 0. |
| <input type="radio"/> $\cos(x) + x^2y^2z^2$. | (X) $-2 \sin(1)$. |
| <input type="radio"/> $x^2y^2z^2$. | () $2 \sin(1)$. |
| <input type="radio"/> $\sin(x) + x^2 + y^2 + z^2$. | () $2 \sin(1) + 2$. |
| <input type="radio"/> $\sin(x)x^2y^2z^2$. | () $-2 \sin(1) + 2$. |

- **Questão 6** (1.0 ponto) Considere o campo vetorial $\vec{F} = x\vec{i} + \vec{j} + z\vec{k}$ e a superfície S formada pelas seis faces do cubo de lado 8 ($x = \pm 4$, $y = \pm 4$ e $z = \pm 4$), orientada para fora. Chamamos de S_1 apenas a face $y = -4$ do cubo, orientado no sentido de $-\vec{j}$. Na primeira coluna marque o item que corresponde $\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS$ e, na segunda, $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 64 |
| (X) -64 | <input type="radio"/> 512 |
| <input type="radio"/> 64 | (X) 1024 |
| <input type="radio"/> -512 | <input type="radio"/> 2048 |
| <input type="radio"/> 512 | <input type="radio"/> 4096 |

- **Questão 7** (2.0 ponto) Calcule o valor de c para que a Hélice

$$\vec{r}(t) = a \cos(wt)\vec{i} + a \sin(wt)\vec{j} + ct\vec{k}, \quad a > 0.$$

tenha torção máxima.

Solução: Começamos calculando a torção:

$$\begin{aligned}\vec{r}'(t) &= -aw \sin(wt)\vec{i} + aw \cos(wt)\vec{j} + c\vec{k}, \\ \vec{r}''(t) &= -aw^2 \cos(wt)\vec{i} - aw^2 \sin(wt)\vec{j}, \\ \vec{r}'''(t) &= aw^3 \sin(wt)\vec{i} - aw^3 \cos(wt)\vec{j}, \\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -aw \sin(wt) & aw \cos(wt) & c \\ -aw^2 \cos(wt) & -aw^2 \sin(wt) & 0 \end{vmatrix} = aw^2 c \sin(wt)\vec{i} - aw^2 c \cos(wt)\vec{j} + a^2 w^3 \vec{k}, \\ \|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\| &= \sqrt{a^2 w^4 c^2 + a^4 w^6} = aw^2 \sqrt{c^2 + a^2 w^2}, \\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) \cdot \vec{r}'''(t) &= a^2 w^5 c \\ \tau &= \frac{wc}{c^2 + a^2 w^2}\end{aligned}$$

Agora, vamos derivar com respeito a c :

$$\frac{d\tau}{dc} = \frac{w(c^2 + a^2 w^2) - 2wc^2}{(c^2 + a^2 w^2)^2} = \frac{w(-c^2 + a^2 w^2)}{(c^2 + a^2 w^2)^2} = 0.$$

Isso implica em

$$-c^2 + a^2 w^2 = 0,$$

ou seja,

$$c = \pm aw.$$

Observe que a torção pode ser negativa ou positiva, dependendo do sinal do produto wc . Como queremos a torção máxima, estamos interessados nos valores de wc positivos. Também, quando $c = 0$ temos $\tau = 0$ e, $\lim_{c \rightarrow \infty} \tau = 0$, o que indica que τ passa por um máximo e um mínimo. Concluímos que o máximo acontece para o seguinte valor de c :


$$c = aw.$$

- **Questão 8** (2.0 ponto) Considere a superfície S aberta dada na figura ao lado, orientada no sentido côncavo-convexo. Seja C a curva no plano $z = 0$ que limita S . A equação da superfície S é dada por

$$z^2 + 5z^3 + e^{-5z} = 3 - x^2 - y^2.$$

Considere o campo $\vec{F} = -(y+z)\vec{i} + x\vec{j} + z^2x\vec{k}$. Calcule

$$\iint_S \vec{\nabla} \times \vec{F} \cdot \vec{n} dS.$$



Dica: Use o teorema de Stokes.

Solução: Pelo teorema de Stokes, temos:

$$\iint_S \vec{\nabla} \times \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D \vec{\nabla} \times \vec{F} \cdot \vec{n} dS,$$

Aqui, C é o corte da superfície S com o plano $z = 0$, isto é,

$$0^2 + 5 \cdot 0^3 + e^0 = 3 - x^2 - y^2.$$

Logo, C é a circunferência $x^2 + y^2 = 2$. Também, D é o disco no plano $z = 0$, com limites satisfazendo $x^2 + y^2 \leq 2$. Vamos usar a última expressão do lado direito para calcular o fluxo através da superfície:

$$\iint_D \vec{\nabla} \times \vec{F} \cdot \vec{n} dS.$$

Assim, calculamos o rotacional do campo:

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y - z & x & z^2x \end{vmatrix} = (-1 - z^2)\vec{j} + 2\vec{k}.$$

Finalmente, temos

$$\iint_D \vec{\nabla} \times \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_D ((-1 - z^2)\vec{j} + 2\vec{k}) \cdot \vec{k} dA = 2 \iint_D 1 dA = 4\pi.$$