

1-6	7	8	Total

Nome: _____ Cartão: _____
Ponto extra: Wikipédia Apresentação Nenhum Tópico: _____

Regras Gerais:

- Não é permitido o uso de calculadoras, telefones ou qualquer outro recurso computacional ou de comunicação.
- Trabalhe individualmente e sem uso de material de consulta além do fornecido.
- Devolva o caderno de questões preenchido ao final da prova.

Regras para as questões abertas

- Seja sucinto, completo e claro.
- Justifique todo procedimento usado.
- Indique identidades matemáticas usadas, em especial, itens da tabela.
- Use notação matemática consistente.

Tabela do operador $\vec{\nabla}$:

$f = f(x, y, z)$ e $g = g(x, y, z)$ são funções escalares;
 $\vec{F} = \vec{F}(x, y, z)$ e $\vec{G} = \vec{G}(x, y, z)$ são funções vetoriais.

1.	$\vec{\nabla}(f + g) = \vec{\nabla}f + \vec{\nabla}g$
2.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{F} + \vec{G}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} + \vec{\nabla} \cdot \vec{G}$
3.	$\vec{\nabla} \times (\vec{F} + \vec{G}) = \vec{\nabla} \times \vec{F} + \vec{\nabla} \times \vec{G}$
4.	$\vec{\nabla}(fg) = f\vec{\nabla}g + g\vec{\nabla}f$
5.	$\vec{\nabla} \cdot (f\vec{F}) = (\vec{\nabla}f) \cdot \vec{F} + f(\vec{\nabla} \cdot \vec{F})$
6.	$\vec{\nabla} \times (f\vec{F}) = \vec{\nabla}f \times \vec{F} + f\vec{\nabla} \times \vec{F}$
7.	$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}f = \vec{\nabla}^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2},$ onde $\vec{\nabla}^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ é o operador laplaciano
8.	$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}f) = 0$
9.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = 0$
10.	$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) - \vec{\nabla}^2 \vec{F}$
11.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = G \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) - F \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{G})$
12.	$\vec{\nabla} \times (\vec{F} \times \vec{G}) = (\vec{G} \cdot \vec{\nabla}) \vec{F} - \vec{G} (\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) - (\vec{F} \cdot \vec{\nabla}) \vec{G} + \vec{F} (\vec{\nabla} \cdot \vec{G})$
13.	$\vec{\nabla}(\vec{F} \cdot \vec{G}) = (\vec{G} \cdot \vec{\nabla}) \vec{F} + (\vec{F} \cdot \vec{\nabla}) \vec{G} + \vec{F} \times (\vec{\nabla} \times \vec{G}) + \vec{G} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F})$
14.	$\vec{\nabla}\varphi(r) = \varphi'(r)\hat{r}$

Curvatura, torção e aceleração:

Nome	Definição
Curvatura	$\kappa = \left\ \frac{d\vec{T}}{ds} \right\ = \left\ \frac{d\vec{T}}{dt} \right\ = \frac{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ }{\ \vec{r}'(t)\ ^3}$
Torção	$\tau = -\frac{d\vec{B}}{ds} \cdot \vec{N} = \frac{(\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)) \cdot \vec{r}'''(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ ^2}$
Módulo da Torção	$ \tau = \left\ \frac{d\vec{B}}{ds} \right\ = \left\ \frac{d\vec{B}}{dt} \right\ = \left\ \frac{\frac{d\vec{B}}{dt}}{\frac{ds}{dt}} \right\ $
Aceleração normal	$a_N = \frac{\ \vec{a} \times \vec{v}\ }{v} = \frac{v^2}{\rho} = \kappa v^2$
Aceleração tangencial	$a_T = \frac{\vec{a} \cdot \vec{v}}{v} = \frac{dv}{dt}$

Equações de Frenet-Serret:

$\frac{d\vec{T}}{ds} = \kappa \vec{N}$
$\frac{d\vec{N}}{ds} = -\kappa \vec{T} + \tau \vec{B}$
$\frac{d\vec{B}}{ds} = -\tau \vec{N}$

- **Questão 1** (1.0 ponto) Seja o campo vetorial conservativo $\vec{F}(x, y, z) = ye^z\vec{i} + xe^z + xy\vec{e}^z$, o campo escalar $\psi(x, y, z) = y^4 + xz$ e $\vec{G} = \vec{F} + \nabla\psi$. Assinale na primeira coluna um potencial φ para \vec{F} e na segunda alternativa o valor de $W := \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$. Onde C é curva parametrizada por:

$$\vec{r}(t) = 2^t\vec{i} + t^2\vec{j} + tk\vec{k}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

O potencial φ :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> $\varphi(x, y, z) = ye^z + C$ | <input type="checkbox"/> $2(1+e)$ |
| <input type="checkbox"/> $\varphi(x, y, z) = xe^z + C$ | <input type="checkbox"/> 4 |
| <input type="checkbox"/> $\varphi(x, y, z) = zye^x + C$ | <input type="checkbox"/> $2+e$ |
| <input type="checkbox"/> $\varphi(x, y, z) = xze^y + C$ | <input type="checkbox"/> 2 |
| <input type="checkbox"/> $\varphi(x, y, z) = xye^z + C$ | <input type="checkbox"/> $2e$ |

$W :$

- | |
|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> $2(1+e)$ |
| <input type="checkbox"/> 4 |
| <input type="checkbox"/> $2+e$ |
| <input type="checkbox"/> 2 |
| <input type="checkbox"/> $2e$ |

- **Questão 2** (1.0 ponto) Considere o campo radial $\vec{F}(x, y, z) = \hat{r}$ esboçado na figura ao lado e os caminhos C_1 , a reta que liga o ponto $(-3, -3, 0)$ ao ponto $(3, 3, 0)$, a circunferência C_2 e a elipse C_3 orientadas no sentido anti-horário. Defina:


$$W_1 = \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r},$$

$$W_2 = \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r},$$

$$W_3 = \int_{C_3} \vec{F} \cdot d\vec{r},$$

Assinale as alternativas corretas em cada uma das duas colunas:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{3}{r}$ | <input type="checkbox"/> $0 = W_2 = W_3 < W_1$ |
| <input type="checkbox"/> $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{2}{r}$ | <input type="checkbox"/> $0 = W_2 < W_3 < W_1$ |
| <input type="checkbox"/> $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = 0$ | <input type="checkbox"/> $0 = W_2 = W_3 = W_1$ |
| <input type="checkbox"/> $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = 2 + 4r$ | <input type="checkbox"/> $0 < W_1 < W_2 < W_3$ |
| <input type="checkbox"/> $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = 2 + r$ | <input type="checkbox"/> $W_1 < 0 = W_2 < W_3$ |



- **Questão 3** (1.0 ponto) Considere a curva parametrizada por:

$$\vec{r}(t) = \cos(t)\vec{i} + \sin(t)\vec{j} + \cos(2t)\vec{k}.$$

Assinale as alternativas que indicam corretamente a curvatura em $t = 0$ e torção em $t = 0$:

Curvatura em $t = 0$

- () 5
- () $\sqrt{11}$
- () 11
- () 17
- () 17^2
- () $\sqrt{17}$

Torção em $t = 0$

- () $-\sqrt{17}$
- () -17
- () 17^2
- () $\sqrt{11}$
- () 0
- () 11

- **Questão 4** (1.0 ponto) A posição de uma partícula é dada pela função vetorial $\vec{r}(t) = (1+t)^{3/2}\vec{i} + (1-t)^{3/2}\vec{j}$, que descreve uma curva chamada astróide. Assinale na primeira coluna o domínio de definição de $\vec{r}(t)$ e, na segunda, a distância percorrida (comprimento de arco) ao longo de todo o domínio.

Domínio:


- () $(-1, 1]$
- () $[-1, 1)$
- () $[-1, 1]$
- () $(-1, 1)$
- () Nenhuma das anteriores

Distância percorrida:

- () $\sqrt{2}$
- () $\sqrt{3}$
- () 3
- () $3\sqrt{2}$
- () $3\sqrt{3}$

Questão 5 (1.0 ponto) O cicloide é uma curva definida por um ponto sobre uma circunferência que rola sem deslizar sobre uma reta. Considere a trajetória deste ponto parametrizada por $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$, $t > 0$, onde r é uma constante e

$$x(t) = R(t - \operatorname{sen}(t)) \\ y(t) = R(1 - \cos(t)).$$



Supondo $R = 2$, assinale na primeira coluna o valor do parâmetro t para o qual $\vec{r}(t) = (\pi - 2, 2)$. Na segunda coluna assinale o vetor velocidade neste instante:
O parâmetro t :

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| () $\frac{\pi}{2}$ | () $4\vec{i} + 2\vec{j}$ |
| () π | () $2\vec{i} + 2\vec{j}$ |
| () $\frac{3\pi}{2}$ | () $4\vec{i} + 4\vec{j}$ |
| () 2π | () $2\vec{i}$ |
| () $\frac{5\pi}{2}$ | () $2\vec{j}$ |
| | () $4\vec{i}$ |

Velocidade:

• **Questão 6** (1.0 ponto) Seja S a superfície no plano xy limitada pelos eixos x e y e pelo arco de circunferência de raio 4 centrado na origem restrito ao primeiro quadrante. A superfície S é orientada no sentido positivo do eixo z e o caminho C é a curva que limita S orientada pela regra da mão direita. Seja $\vec{F} = x^3\vec{i} + x^3\vec{j}$ e $\vec{G} = \vec{\nabla}\|\vec{F}\|$.

Assinale as alternativas que indicam, respectivamente, os valores de $W_1 := \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ e $W_2 := \int_C \vec{G} \cdot d\vec{r}$.
 W_1 :

- | | |
|--------------|----------|
| () -12π | () -6 |
| () 0π | () -3 |
| () 12π | () 0 |
| () 24π | () 3 |
| () 48π | () 6 |

W_2 :

- **Questão 7** (2.0 ponto) Dada uma função escalar $f(r)$ onde $r = \|\vec{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

a) Use a regra da cadeia para obter a fórmula do gradiente de $f(r)$ dada por

$$\vec{\nabla}f(r) = f'(r)\hat{r}.$$

b) Use, nesta ordem, a definição de laplaciano de uma função escalar, depois o resultado do item anterior e, finalmente, a tabela de fórmulas do operador $\vec{\nabla}$ para obter a seguinte fórmula:

$$\vec{\nabla}^2 f(r) = 2\frac{f'(r)}{r} + f''(r).$$

- **Questão 8** (2.0 pontos) Considere a superfície fechada orientada para fora composta superiormente pela superfície de rotação descrita como

$$z = f(x, y) = 1 - (x^2 + y^2), \quad z > 0$$

e inferiormente por:

$$z = 0, \quad x^2 + y^2 \leq 1.$$

Seja o campo vetorial dado por $\vec{F} = x^3\vec{i} + x\vec{j} + \vec{k}$. Calcule o valor do fluxo

$$\iint \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$