

1-5	6	7	Total

**Nome:** \_\_\_\_\_ **Cartão:** \_\_\_\_\_

Regras Gerais:

- Não é permitido o uso de calculadoras, telefones ou qualquer outro recurso computacional ou de comunicação.
- Trabalhe individualmente e sem uso de material de consulta além do fornecido.
- Devolva o caderno de questões preenchido ao final da prova.

Regras para as questões abertas

- Seja sucinto, completo e claro.
- Justifique todo procedimento usado.
- Indique identidades matemáticas usadas, em especial, itens da tabela.
- Use notação matemática consistente.

Tabela do operador  $\vec{\nabla}$ :

$f = f(x, y, z)$  e  $g = g(x, y, z)$  são funções escalares;  
 $\vec{F} = \vec{F}(x, y, z)$  e  $\vec{G} = \vec{G}(x, y, z)$  são funções vetoriais.

1.	$\vec{\nabla}(f + g) = \vec{\nabla}f + \vec{\nabla}g$
2.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{F} + \vec{G}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} + \vec{\nabla} \cdot \vec{G}$
3.	$\vec{\nabla} \times (\vec{F} + \vec{G}) = \vec{\nabla} \times \vec{F} + \vec{\nabla} \times \vec{G}$
4.	$\vec{\nabla}(fg) = f\vec{\nabla}g + g\vec{\nabla}f$
5.	$\vec{\nabla} \cdot (f\vec{F}) = (\vec{\nabla}f) \cdot \vec{F} + f(\vec{\nabla} \cdot \vec{F})$
6.	$\vec{\nabla} \times (f\vec{F}) = \vec{\nabla}f \times \vec{F} + f\vec{\nabla} \times \vec{F}$
7.	$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}f = \vec{\nabla}^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2},$ onde $\vec{\nabla}^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ é o operador laplaciano
8.	$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}f) = 0$
9.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = 0$
10.	$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) - \vec{\nabla}^2 \vec{F}$
11.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = G \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) - F \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{G})$
12.	$\vec{\nabla} \times (\vec{F} \times \vec{G}) = (\vec{G} \cdot \vec{\nabla}) \vec{F} - \vec{G}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) - (\vec{F} \cdot \vec{\nabla}) \vec{G} + \vec{F}(\vec{\nabla} \cdot \vec{G})$
13.	$\vec{\nabla}(\vec{F} \cdot \vec{G}) = (\vec{G} \cdot \vec{\nabla}) \vec{F} + (\vec{F} \cdot \vec{\nabla}) \vec{G} + \vec{F} \times (\vec{\nabla} \times \vec{G}) + \vec{G} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F})$
14.	$\vec{\nabla}\varphi(r) = \varphi'(r)\hat{r}$

Curvatura, torção e aceleração:

Nome	Fórmula
Vetor normal	$\vec{N} = \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) \times \vec{r}'(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) \times \vec{r}'(t)\ }$
Vetor binormal	$\vec{B} = \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ }$
Curvatura	$\kappa = \left\  \frac{d\vec{T}}{ds} \right\  = \left\  \frac{d\vec{r}}{dt} \right\  = \frac{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ }{\ \vec{r}'(t)\ ^3}$
Torção	$\tau = -\frac{d\vec{B}}{ds} \cdot \vec{N} = \frac{(\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)) \cdot \vec{r}'''(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ ^2}$
Módulo da Torção	$ \tau  = \left\  \frac{d\vec{B}}{ds} \right\  = \left\  \frac{d\vec{B}}{dt} \right\ $
Aceleração normal	$a_N = \frac{\ \vec{a} \times \vec{v}\ }{v} = \frac{v^2}{\rho} = \kappa v^2$
Aceleração tangencial	$a_T = \frac{\vec{a} \cdot \vec{v}}{v} = \frac{dv}{dt}$

Equações de Frenet-Serret:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{T}}{ds} &= \kappa \vec{N} \\ \frac{d\vec{N}}{ds} &= -\kappa \vec{T} + \tau \vec{B} \\ \frac{d\vec{B}}{ds} &= -\tau \vec{N} \end{aligned}$$

- **Questão 1a** (0.5 ponto cada item) Considere a trajetória parametrizada pela seguinte função vetorial:

$$\vec{r}(t) = \sin(2t)\vec{i} + \cos(t)\vec{j}, \quad t \geq 0$$

Seja  $t_0$  o primeiro instante positivo em que a trajetória passa pela origem.


Assinale na primeira coluna o valor de  $t_0$ . Na segunda coluna assinale o vetor tangente unitário à trajetória neste instante:

O parâmetro  $t_0$ :

- ( ) 0
- ( )  $\frac{\pi}{8}$
- ( )  $\frac{\pi}{4}$
- ( )  $\frac{\pi}{2}$
- ( )  $\frac{3\pi}{2}$

Tangente unitário em  $t_0$ :

- ( )  $\frac{\sqrt{5}}{5}(2\vec{i} + \vec{j})$
- ( )  $\frac{\sqrt{5}}{5}(2\vec{i} - \vec{j})$
- ( )  $\frac{\sqrt{5}}{5}(-2\vec{i} + \vec{j})$
- ( )  $\frac{\sqrt{5}}{5}(-2\vec{i} - \vec{j})$
- ( ) Nenhuma das anteriores



- **Questão 1b** (0.5 ponto cada item) Considere a mesma trajetória da questão anterior. Assinale na primeira coluna os vetores binormais unitários, respectivamente,  $t_1 := 0$   $t_2 := \pi$ . Na segunda coluna, assinale o valor da curvatura nesses pontos, que são idênticos:

$\vec{B}(0)$  e  $\vec{B}(\pi)$ :

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| ( ) $\vec{k}$ e $\vec{k}$   | ( ) 0   |
| ( ) $\vec{k}$ e $-\vec{k}$  | ( ) 1/4 |
| ( ) $-\vec{k}$ e $\vec{k}$  | ( ) 1/2 |
| ( ) $-\vec{k}$ e $-\vec{k}$ | ( ) 1   |
| ( ) Nenhuma das anteriores  | ( ) 2   |

$\kappa(0) = \kappa(\pi)$ :

- **Questão 2** (0.5 ponto cada item) Considere a trajetória dada pela parametrização a seguir:

$$\vec{r}(t) = \cos(t)\vec{i} + \sin(t)\vec{j} + \frac{1}{2}t^2\vec{k}$$

Assinale as alternativas que indicam respectivamente a norma da velocidade e a torção no ponto  $t = \pi$ .

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ( ) $\pi^2 + 1$        | ( ) $\frac{\pi}{\pi^2 + 1}$ |
| ( ) $\pi^2 + 2$        | ( ) $\frac{\pi}{\pi^2 + 2}$ |
| ( ) $\sqrt{\pi^2 + 1}$ | ( ) $\frac{\pi}{\pi^2 - 1}$ |
| ( ) $\sqrt{\pi^2 + 2}$ | ( ) $\frac{\pi}{\pi^2 - 2}$ |
| ( ) N. d. a.           | ( ) N. d. a.                |

- **Questão 3** (0.5 ponto cada item) A temperatura em um ponto  $P(x, y)$  de uma placa é dada por:

$$T(x, y) = \frac{xy}{1+xy}$$

As dimensões da placa são  $0 \leq x, y \leq 4$ . Em relação ao ponto  $(1, 2)$ , assinale na primeira coluna o vetor unitário  $\vec{u}$  na direção e sentido da maior taxa de variação da temperatura e na segunda coluna, a intensidade dessa maior taxa de variação:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| ( ) $\frac{\sqrt{5}}{5}(\vec{i} + 2\vec{j})$  | ( ) $\frac{\sqrt{5}}{5}$   |
| ( ) $\frac{\sqrt{5}}{5}(2\vec{i} + \vec{j})$  | ( ) $\frac{\sqrt{3}}{9}$   |
| ( ) $\frac{\sqrt{5}}{5}(\vec{i} - 2\vec{j})$  | ( ) $\frac{\sqrt{5}}{45}$  |
| ( ) $\frac{\sqrt{5}}{5}(-2\vec{i} + \vec{j})$ | ( ) $\frac{\sqrt{15}}{45}$ |
| ( ) $\frac{\sqrt{5}}{5}(-\vec{i} + 2\vec{j})$ | ( ) $\frac{\sqrt{5}}{3}$   |
| ( ) $\frac{\sqrt{5}}{5}(2\vec{i} - \vec{j})$  | ( ) $\frac{\sqrt{5}}{9}$   |

- **Questão 4** (0.5 ponto cada item) Seja o campo vetorial conservativo  $\vec{F}(x, y, z) = ye^z\vec{i} + xe^z\vec{j} + xye^z\vec{k}$ . Assinale na primeira coluna um potencial  $\varphi$  para  $\vec{F}$  e na segunda coluna o valor de  $W := \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ , onde  $C$  é curva parametrizada por:

$$\vec{r}(t) = 2^t\vec{i} + t^2\vec{j} + \ln(1+t)\vec{k}, \quad 1 \leq t \leq 3.$$

O potencial  $\varphi$ :


- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| ( ) $\varphi(x, y, z) = xe^z + C$   | ( ) -288 |
| ( ) $\varphi(x, y, z) = ye^z + C$   | ( ) -284 |
| ( ) $\varphi(x, y, z) = xy e^z + C$ | ( ) -147 |
| ( ) $\varphi(x, y, z) = xze^y + C$  | ( ) 147  |
| ( ) $\varphi(x, y, z) = zye^x + C$  | ( ) 284  |
| ( ) $\varphi(x, y, z) = xye^x + C$  | ( ) 288  |

$W$ :

- **Questão 5** (1.0 ponto) Considere o campo  $\vec{F}(x, y, z) = f(x, y)\vec{i} + g(x, y)\vec{j}$  esboçado na figura ao lado e os caminhos  $C_1$ ,  $C_2$  e  $C_3$  que começam no ponto  $(4, 4, 0)$  e terminam no ponto  $(-2, -2, 0)$ . Defina  $W_1 = \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ ,  $W_2 = \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$  e  $W_3 = \int_{C_3} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ .

Assinale as alternativas corretas:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> $0 = W_1 = W_2 = W_3$ | <input type="checkbox"/> $\vec{i} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0}$ em todos os pontos. |
| <input type="checkbox"/> $0 = W_1 < W_2 = W_3$ | <input type="checkbox"/> $\vec{i} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{F} > 0$ em todos pontos.          |
| <input type="checkbox"/> $0 < W_1 = W_2 = W_3$ | <input type="checkbox"/> $\vec{i} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{F} < 0$ em todos pontos.          |
| <input type="checkbox"/> $0 < W_1 < W_2 = W_3$ | <input type="checkbox"/> $\vec{j} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$ em todos pontos.          |
| <input type="checkbox"/> $0 = W_1 < W_2 < W_3$ | <input type="checkbox"/> $\vec{k} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$ em todos pontos.          |



- **Questão 6** (2 pontos): Considere o campo vetorial dado por

$$\vec{F} = z^2 \vec{k}$$

e a região  $V$  limitada superiormente por

$$z = 1$$

e inferiormente por  $x^2 + y^2 - z = 0$ . Calcule o fluxo de  $\vec{F}$  através da superfície  $S$  que limita  $V$  orientada para fora usando:

- **Item a)** (1.0) Calcule o fluxo  $\Phi$  via parametrização direta da superfície (sem usar o Teorema da Divergência).
- **Item b)** (1.0) Calcule o fluxo  $\Phi$  usando o Teorema da Divergência.

- **Questão 7** (2 pontos) Considere o campo dado por  $\vec{F} = 2xye^z\vec{i} - x^2 \cos(z)\vec{j} + \cos(xyz)\vec{k}$  e caminho  $C$  que contorna no sentido **horário** a porção do plano  $xy$  limitada pelos eixos ordenados, a reta  $x = 2$ , a reta  $y = 2$  e a hipérbole  $xy = 1$ .

Calcule a integral de linha  $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ , esboçando a região de integração.